

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)

Version 6.0 (MedDRA 28.0)

Published: July 10, 2025

有害事象共通用語規準 v6.0 日本語訳 JCOG 版 (略称 : CTCAE v6.0 - JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記 : MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

Common Terminology Criteria for Adverse Events v6.0 (CTCAE)

– Publish Date: July 10, 2025 –

「有害事象共通用語規準 v6.0 日本語訳 JCOG 版」

(略称 : CTCAE v6.0 - JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.0 (日本語表記 : MedDRA/J v28.1) 対応 2025 年 10 月 1 日]

はじめに Introduction

NCI 有害事象共通用語規準 v5.0 は、有害事象 (AE) の評価や報告に用いることができる記述的用語集である。また各 AE について重症度 (severity) のスケール (Grade) を示している。

器官別大分類 SOC

MedDRA の最上位の階層である SOC (器官別大分類 : System Organ Class) は、解剖や生理学に基づく臓器・器官、病因、目的 (例 : SOC「臨床検査」は臨床検査結果の評価のための SOC) ごとに定義されている。CTCAE 用語は MedDRA の Primary SOC により分類されている。それぞれの SOC 内で、有害事象は列記され、重症度 (Grade) の記述が併記されている。

CTCAE 用語 CTCAE Terms

AE とは、治療や処置に際して観察される、あらゆる好ましくない意図しない徴候 (臨床検査値の異常も含む)、症状、疾患であり、治療や処置との因果関係は問わない。すなわち因果関係があると判断されるものと、因果関係ありと判断されないもの両者を含む。AE は特定の医学的事象を一意的に表すように定義された用語であり、医学的な記録や報告および科学的な分析に使用される。各 CTCAE v6.0 用語は MedDRA v28.0 の LLT (下層語) を用いている。

グレード Grades

Grade は AE の重症度を意味する。CTCAE では Grade 1-5 を以下の原則に従って定義しており、各 AE の重症度の説明を個別に記載している :

Grade 1 軽症; 症状がない, または軽度の症状がある; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない

Grade 2 中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限*

Grade 3 重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 機能障害; 身の回りの日常生活動作の制限**

Grade 4 生命を脅かす; 緊急処置を要する

Grade 5 AE による死亡

Grade 説明文中のセミコロン (;) は「または」を意味する。

ダッシュ (-) は該当する Grade が定義されていないことを意味する。すべての AE がすべての Grade を含むわけではないので、一部の AE では Grade の選択肢が 5 種類未満となっている。

Grade 5

一部の AE には Grade 5 (死亡) が該当しないため選択肢に含めていない。

定義 Definition

各 AE 用語の意味を明確にするため、簡潔な定義を示している。

ダッシュ (-) は該当する定義がないことを意味する。

ナビゲーションノート Navigational Notes

AE を選択する際の指針を記載しており、当該 AE に加えて、もしくは当該 AE の代わりに **grading** を考慮すべき他の AE を選択する指針を含む。ダッシュ (-) は **grading** 上の注意がないことを意味する。

日常生活動作 Activities of Daily Living (ADL)

*身の回り以外の日常生活動作 (instrumental ADL) とは、食事の準備、日用品や衣服の買い物、電話の使用、金銭の管理などをさす。

**身の回りの日常生活動作 (self care ADL) とは、入浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレの使用、薬の内服が可能で、寝たきりではない状態をさす。

※ CTCAE v6.0 では多くの MedDRA 用語を用いている。

MedDRA の詳細については the MedDRA MSSO Web site を参照されたい (<https://www.meddra.org/>)。

なお、日本語版の MedDRA (MedDRA/J) に関する詳細は、一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 JMO 事業部のウェブサイト参照されたい (<https://www.jmo.pmrj.jp/>)。

日本語訳に関する注

「有害事象共通用語規準 v6.0 日本語訳 JCOG 版」(略称: CTCAE v6.0 - JCOG) について

本「有害事象共通用語規準 v6.0 日本語訳 JCOG 版」(以下、CTCAE v6.0 - JCOG) は、2025 年 7 月に米国 National Cancer Institute (NCI) の Cancer Therapy Evaluation Program (CTEP) が公表した「Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v6.0」(以下、オリジナル CTCAE v6.0) の日本語訳 JCOG 版である。

(CTEP CTCAE URL : <https://dctd.cancer.gov/research/ctep-trials/for-sites/adverse-events#ctcae>)

CTCAE v5.0 から v6.0 への英語原文の改訂では、用語の追加や削除、SOC の変更、Grade の追加/削除/文言変更/検査値のカットオフの変更や、定義やナビゲーションノートの文言変更が行われたが、基本構造は v5.0 と変わらない。今回の日本語訳においても、英語原文に変更がない箇所も含めて全体を見直し、用語を統一する方針で文言の変更を行った。

なお今回の改訂では、頻用される AE である「好中球数減少 (Neutrophil count decreased)」、「血小板減少症 (Thrombocytopenia)」の Grade 定義のカットオフ値が変更されており、注意が必要である(「血小板減少症」は(「臨床検査」の「血小板数減少」から「血液およびリンパ系障害」に SOC と AE term が変更)。また、「肺感染」が「肺炎」になり、「高血糖」は血糖値での Grade 定義になった。

利用に際して

臨床試験(治験を含む)の有害事象判定規準として用いる等の非営利目的に限り、PDF ファイル、Excel ファイルを JCOG ウェブサイト (<http://www.jcog.jp>) からダウンロードして利用可能である。利用許諾は不要であるが、利用に当たっては JCOG ウェブサイトを引用していただきたい。Excel ファイルの初期設定は PDF ファイルと同じく、Grade の定義等について日本語訳のみが表示される形式になっているが、隠している列には英語原文が含まれている。用途に合わせて利用されたい。

カテゴリ・有害事象の並び順

カテゴリは MedDRA の最上位の階層である SOC (器官別大分類) で構成されている。カテゴリと有害事象の並び順はオリジナル CTCAE v6.0 のまま、アルファベット順とした。

MedDRA/J への対応

オリジナル CTCAE は v4.0 への改訂以降、Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) に完全準拠した。オリジナル CTCAE v6.0 の初版は MedDRA v28.0 に対応し、その日本語訳の初版は日本語版 MedDRA (MedDRA/J) v28.1 に対応している。そのため、有害事象名 (CTCAE v6.0 Term 日本語) は本 CTCAE v6.0 - JCOG で自由に変更することはできない。有害事象名に対応する MedDRA/J の用語が変更された場合には、CTCAE v6.0 - JCOG を改訂して JCOG ウェブサイトでお知らせする。

なお、CTCAE v6.0 - JCOG の修正・改訂履歴および対応するオリジナル CTCAE、MedDRA、MedDRA/J のバージョンは、「CTCAE v6.0 - JCOG の修正・改訂履歴および対応するオリジナル CTCAE、MedDRA、MedDRA/J のバージョン」に示す。

また、MedDRA/J に関する詳細は、一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団 JMO 事業部のウェブサイト参照されたい (<https://www.jmo.pmrj.jp/>)。

Grading における “nearest match” と “what should be done” の原則

有害事象の grading に際しては、それぞれ Grade 0~4 の定義内容にもっとも近いものに grading する (nearest match)。複数の Grade の定義に同程度に該当し、いずれかに決めがたい時は、より高い Grade に grading する (highest grade)。

また、Grade に具体的な処置が記載されている場合は、その臨床的な必要性から grading する。例えば、患者の胸水が増えており、酸素吸入や胸腔ドレナージが適応となる状況にもかかわらずそれを患者が拒否した場合など

がある。こうした場合には、実際に治療が行われたかどうか (what was actually done) ではなく、何が行なわれるべきであったか (what should be done) という医学的判断に基づいて grading を行う。

用語の定義 (CTCAE v6.0 AE Term Definition)

各有害事象用語の定義を日本語に訳して記載している。

なお、本項の英語原文では、ほとんどの有害事象用語が“A disorder characterized by …”や“A finding of …”の書き出しで規定されている。しかし、日本語への訳出にあたっては、“A disorder characterized by …”に対応する「…によって特徴づけられる障害」や“A finding of …”に対応する「…の所見」の記述がなくとも意味が通じるか、ない方が簡潔な表現となるものについては、“A disorder characterized by …”や“A finding of …”を原則として訳出しなかった。

訳語の解説

・「or」の扱い

解説文にも「; (セミコロン)」が「or」の意味であることが記されているが、本規準では、1 文中で複数項目が「or」の関係にある場合、逐語訳にすると不自然な日本語となるため、「or」を「または」、「;」、「/ (スラッシュ)」、「や」で表現した。いずれも「or」の意味である。

・日常生活動作 (Activities of Daily Living : ADL)

身の回りの日常生活動作 (self care ADL)

入浴、着衣・脱衣、食事の摂取、トイレの使用、薬の内服が可能で、寝たきりではない状態をさす。生命維持に (自立した生活を行う上で) 必要な最低限の身の回りの動作を自ら行うことができる状態をいう。

身の回り以外の日常生活動作 (instrumental ADL)

食事の準備、日用品や衣服の買い物、電話の使用、金銭の管理などをさす。

・不等号 : >=、<=、>、<

日本語としては不自然になるが、誤解を避けるために、原則として「以上」や「未満」と訳さず、原文の不等号をそのまま用いた。

連続変量データのカットオフについて

連続変量データで Grade が定義されている有害事象のうち、Grade 間で数値が途切れているものについては、取扱いが明確になるように、カットオフ値や不等号を変更した。

略語一覧

オリジナル CTCAE v6.0 にて用いられている以下の略語はそのまま用いた。

LLN : 基準範囲下限、ULN : 基準範囲上限、ANC : 好中球数 (成熟好中球数)、

pRBC : 濃厚赤血球、TPN : 非経口栄養、CNS : 中枢神経系、BSA : 体表面積

CTCAE v6.0 - JCOG の修正・改訂履歴および対応するオリジナル CTCAE、MedDRA、MedDRA/J のバージョン

2025 年 10 月 1 日作成 CTCAE v6.0/MedDRA v28.0 (日本語表記 : MedDRA/J v28.1) 対応

2026 年 3 月 1 日改訂 誤記修正 CTCAE 本体修正

※修正・改訂内容は JCOG ウェブサイトにてご確認ください <http://www.jcog.jp/>

日本語訳担当

福田治彦 (JCOG データセンター)、佐野裕亮 (JCOG 運営事務局)

MedDRA/J 改訂時更新担当

木村 綾 (JCOG 運営事務局)

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10002272	血液およびリンパ系障害	Anemia	貧血	ヘモグロビン<LLN - 10.0 g/dL; <LLN - 6.2 mmol/L; <LLN - 100 g/L	ヘモグロビン<10.0 - 8.0 g/dL; <6.2 - 4.9 mmol/L; <100 - 80 g/L	ヘモグロビン<8.0 g/dL; <4.9 mmol/L; <80 g/L; 輸血を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	血液100 mL中のヘモグロビン量の減少。皮膚・粘膜の蒼白、息切れ、動悸、軽度の収縮期雑音、嗜眠、易疲労感の貧血徴候を含む	-
10002969	血液およびリンパ系障害	Aplastic anemia	再生不良性貧血	-	成長因子の使用を要する; 輸血を要する	重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	骨髄が新しい血球を十分に造り出すことができない病態	この用語に加えて各血球数の減少を報告する必要はない
10005329	血液およびリンパ系障害	Blood and lymphatic system disorders - Other, specify	血液およびリンパ系障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10048580	血液およびリンパ系障害	Bone marrow hypocellular	骨髄細胞減少	軽度の低形成または年齢相応細胞密度からの<=25%の低下	中等度の低形成または年齢相応細胞密度からの>25 - <=50%の低下	高度の低形成または年齢相応細胞密度からの>50 - <=75%の低下	2週間を超えて持続する骨髄無形成	死亡	骨髄の造血細胞産生能不全	骨髄細胞減少が確認されない場合は、貧血、血小板減少症[血液およびリンパ系障害]および/または好中球数減少[臨床検査]のgradingを考慮する
10013442	血液およびリンパ系障害	Disseminated intravascular coagulation	播種性血管内凝固	-	検査値異常はあるが出血なし	検査値異常および出血	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	全身の凝血形成をきたす血液凝固機序の全身性かつ病的な活性化。血小板と凝固因子の消耗による出血リスクの増加	-
10014950	血液およびリンパ系障害	Eosinophilia	好酸球増加症	>ULNかつ>ベースライン	-	副腎皮質ステロイドを要する	-	-	血中好酸球数の増加を示す臨床検査結果によって特徴づけられる病態	-
10016288	血液およびリンパ系障害	Febrile neutropenia	発熱性好中球減少症	-	-	ANC<1,000/mm ³ で、かつ、1回でも38.3°C(101°F)を超える、または1時間を超えて持続する38°C以上(100.4°F)の発熱	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	ANC<1,000/mm ³ で、かつ、1回でも38.3°C(101°F)を超える、または1時間を超えて持続する38°C以上(100.4°F)の発熱	-
10019491	血液およびリンパ系障害	Hemolysis	溶血	検査で認められる溶血のみ(例: 直接抗グロブリン試験; DAT; Coombs'; 破碎赤血球; ハプトグロビン減少)	溶血があり、かつ>=2 g/dLのヘモグロビン低下	輸血または内科的治療を要する(例: 副腎皮質ステロイド)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	広範な赤血球膜の破壊を示す臨床検査結果によって特徴づけられる病態	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10019493	血液およびリンパ系障害	Hemolytic anemia	溶血性貧血	直近の検査から10%未満のヘモグロビン減少; 治療を要さない	2単位/日以下の赤血球輸血を要する	2単位/日を超える赤血球輸血を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	溶血によって生じた貧血	-
10019515	血液およびリンパ系障害	Hemolytic uremic syndrome	溶血性尿毒症症候群	-	-	臨床症状を伴う検査値異常 (例: 腎不全, 点状出血)	生命を脅かす (例: CNS 出血, 血栓/塞栓, 腎不全)	死亡	腎不全, 溶血性貧血および高度の血小板減少を伴う血栓性微小血管障害で, Shiga toxinを産生する大腸菌O157:H7等の感染による	-
10024378	血液およびリンパ系障害	Leukocytosis	白血球増加症	-	-	> 100,000/mm ³	臨床的に確認された白血球停滞; 緊急処置を要する	死亡	血液中の白血球数が増加	成長因子やステロイド, 白血病によるもの場合には用いない
10025182	血液およびリンパ系障害	Lymph node pain	リンパ節痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	リンパ節の著しい不快感	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10025327	血液およびリンパ系障害	Lymphopenia	リンパ球減少症	あり	-	-	-	-	血中のリンパ球数の減少を示す検査結果に基づく所見	-
10027506	血液およびリンパ系障害	Methemoglobinemia	メトヘモグロビン血症	-	> ULN	緊急処置を要する	生命を脅かす	死亡	血中メトヘモグロビンの増加を示す臨床検査結果によって特徴づけられる病態	-
10043554	血液およびリンパ系障害	Thrombocytopenia	血小板減少症	< LLN - 75,000/mm ³ ; < LLN - 75.0 × 10 ⁹ /L	< 75,000 - 50,000/mm ³ ; < 75.0 - 50.0 × 10 ⁹ /L	< 50,000 - 10,000/mm ³ ; < 50.0 - 10.0 × 10 ⁹ /L; 輸血を要する	< 10,000/mm ³ ; < 10.0 × 10 ⁹ /L; 生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	血液検体での血小板数減少によって特徴づけられる病態	-
10043563	血液およびリンパ系障害	Thrombocytosis	血小板増加症	あり	-	-	-	-	血液中の血小板数の増加を示す検査結果に基づく所見	-
10043645	血液およびリンパ系障害	Thrombotic microangiopathy	血栓性微小血管症	-	外来治療を要する (例: 免疫抑制薬の調整)	輸血または静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす	死亡	溶血性貧血, 高度の血小板減少症, 腎不全を示唆する検査所見を伴う微小血管の血栓形成により特徴づけられる病態	-
10043648	血液およびリンパ系障害	Thrombotic thrombocytopenic purpura	血栓性血小板減少性紫斑病	-	-	臨床症状を伴う検査値異常 (例: 腎不全, 点状出血)	生命を脅かす (例: CNS 出血, 血栓/塞栓, 腎不全)	死亡	ADAMTS13欠損を伴い, 微小血管障害性溶血性貧血, 血小板減少性紫斑病, 発熱, 腎の異常, 痙攣, 片麻痺, 視力異常などのCNS異常が存在する病態。急性または亜急性の経過をとる	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10061589	心臓障害	Aortic valve disease	大動脈弁疾患	症状のない心臓弁肥厚(画像検査による軽度の逆流や狭窄の有無を問わない)	症状がない; 画像検査による中等度の逆流または狭窄	症状がある; 画像検査による高度の逆流または狭窄; 内科的治療によりコントロールできる	生命を脅かす; 緊急処置を要する(例: 弁置換術, 弁形成術)	死亡	大動脈弁の機能や構造の欠陥を特徴とする異常	-
10003586	心臓障害	Asystole	心静止	-	-	治療を要する; 機器(例: ペースメーカー)を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心臓の電気的活動のないリズム障害。典型的には心臓のポンプ機能の停止に伴う病態	-
10003658	心臓障害	Atrial fibrillation	心房細動	症状がなく, 治療を要さない	内科的治療を要するが緊急性はない; 電氣的除細動を要する	症状があり, 緊急処置を要する; 機器(例: ペースメーカー)を要する; アブレーションを要する; 新規発症	生命を脅かす	死亡	P波が識別できないリズム不整と多発性の興奮回路による不整な心室の収縮。上室性に生じるリズム障害	-
10003662	心臓障害	Atrial flutter	心房粗動	症状がなく, 治療を要さない	内科的治療を要するが緊急性はない	症状があり, 緊急処置を要する; 機器(例: ペースメーカー)を要する; アブレーションを要する	生命を脅かす	死亡	心拍200-300回/分での心房全体の攣縮によるリズム不整。心房に起因するリズム障害	-
10003673	心臓障害	Atrioventricular block complete	完全房室ブロック	-	治療を要するが緊急性はない	症状があり, 内科的治療ではコントロール不良, または機器(例: ペースメーカー)によるコントロールが可能; 新規発症	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心房からAV結節を経由して心室に至る電気信号の完全な途絶によるリズム不整	-
10003674	心臓障害	Atrioventricular block first degree	第一度房室ブロック	症状がなく, 治療を要さない	治療を要するが緊急性はない	-	-	-	AV結節を経由する電気信号の0.2秒を超える伝導遅延によるリズム不整。200ミリ秒を超えるPR間隔の延長	-
10007515	心臓障害	Cardiac arrest	心停止	-	-	-	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心臓のポンプ機能の停止	-
10007541	心臓障害	Cardiac disorders - Other, specify	心臓障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10008481	心臓障害	Chest pain - cardiac	胸痛(心臓性)	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 労作時の疼痛; 循環動態は安定; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	安静時の疼痛; 心臓カテーテル検査を要する; 心臓性胸痛の新規発症; 不安定狭心症; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	心筋の酸素化不全による胸骨下部の不快感。例: 狭心症	心筋梗塞[心臓障害]のgradingを考慮する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10019279	心臓障害	Heart failure	心不全	軽度の症状; 治療の開始や増強を要さない	外来での治療の開始や増強を要する	入院を要する	強心薬や機械的な循環補助を要する; 心臓移植を考慮する	死亡	組織代謝に必要な量の血液を心臓が駆出できない状態 充滿圧の上昇のみにより十分な血液を駆出できない場合も含む	無症状の場合, 左室機能不全 [心臓障害]のgradingを考慮する
10049694	心臓障害	Left ventricular dysfunction	左室機能不全	左室駆出率 (LVEF) >=50% かつ以下の1つ以上を満たす: 1) グローバル長軸方向ストレイン (GLS) のベースラインからの15%を超える新たな低下 2) 心臓バイオマーカーの新たな上昇	LVEFが40-49%かつ以下の1つ以上を満たす: 1) LVEFの10%以上の低下 2) GLSのベースラインからの15%を超える新たな低下 3) 心臓バイオマーカーの新たな上昇	新たにLVEFが40%未満に低下	-	-	心機能の無症候性の異常	症状がある場合は心不全 [心臓障害]のgradingを考慮する
10061532	心臓障害	Mitral valve disease	僧帽弁疾患	症状のない弁肥厚 (画像検査による軽度の逆流や狭窄の有無を問わない)	症状がない; 画像検査による中等度の逆流または狭窄	症状がある; 画像検査による高度の逆流または狭窄; 内科的治療によりコントロールできる	生命を脅かす; 緊急処置を要する (例: 弁置換術, 弁形成術)	死亡	僧帽弁の機能や構造の欠陥を特徴とする異常	-
10027786	心臓障害	Mobitz (type) II atrioventricular block	モービッツ2型房室ブロック	症状がなく, 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	症状があり, 内科的治療ではコントロール不良, または機器を要する (例: ペースメーカー)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心房の伝導ブロックに先立つ, 相対的に一定のPR間隔を伴うリズム不整。心房からAV結節を経由して心室へ至る電気信号の伝導の間欠的な途絶による	-
10027787	心臓障害	Mobitz type I	モービッツ1型	症状がなく, 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	症状があり, 内科的治療ではコントロール不良, または機器 (例: ペースメーカー) によるコントロールが可能	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心房の伝導ブロックに先立つ, 進行性のPR間隔の延長を伴うリズム不整。心房からAV結節を経由して心室へ至る電気信号の伝導の間欠的な途絶による	-
10028596	心臓障害	Myocardial infarction	心筋梗塞	-	症状がなく, 画像またはECG変化が過去にあった心筋梗塞に矛盾しない	循環動態は安定, かつ, 心筋トロポニンの1種類以上の値が基準範囲上限の99パーセンタイルを超えており, かつ, 以下の1つ以上を満たす: 1) 心虚血の症状がある 2) ECGの新たな虚血性変化 3) 病的なQ波の出現 4) 心筋虚血に矛盾しないパターン 5) 血管造影で冠動脈の血栓を確認	生命を脅かす; 循環動態が不安定, かつ, 心筋トロポニンの1種類以上の値が基準範囲上限の99パーセンタイルを超えており, かつ, 以下の1つ以上を満たす: 1) 心虚血の症状がある 2) ECGの新たな虚血性変化 3) 病的なQ波の出現 4) 心筋虚血に矛盾しないパターン 5) 血管造影で冠動脈の血栓を確認	死亡	心筋の著しい壊死。灌流領域への血流の遮断による	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10028606	心臓障害	Myocarditis	心筋炎	症状がなく、検査値異常やECG所見のみ	中等度の活動や労作で症状がある	安静時または最小限の活動や労作でも症状があり重症; 治療を要する; 症状の新規発症	生命を脅かす; 緊急処置を要する(例: 持続的静注療法や機械的な循環動態の補助); 循環動態が不安定で、非侵襲的または侵襲的な人工換気を要する; 完全または高度な房室ブロック; 高度な心室性不整脈	死亡	心臓の筋組織の炎症	-
10033557	心臓障害	Palpitations	動悸	軽度の症状; 治療を要さない	治療を要する	-	-	-	脈不整または強い心拍動による不快感	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10034040	心臓障害	Paroxysmal atrial tachycardia	発作性心房頻脈	症状がなく、治療を要さない	内科的治療を要するが緊急性はない	症状があり、緊急処置を要する; アブレーションを要する	生命を脅かす; 内科的治療ではコントロールは不完全; 電氣的除細動を要する	死亡	心拍150-250回/分での心房収縮が突然発現し突然終了するリズム不整。リズム障害は心房に起因する	-
10034474	心臓障害	Pericardial effusion	心嚢液貯留	-	症状がない少量から中等量の心嚢液貯留	生理機能に影響する心嚢液貯留	生命を脅かす; 入院を要する	死亡	心嚢内の液体貯留。多くは炎症による	心膜タンポナーデ、心膜炎[心臓障害]のgradingを考慮する
10053565	心臓障害	Pericardial tamponade	心膜タンポナーデ	-	-	-	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心外膜内の血液や液体貯留による心嚢内圧の上昇	心膜炎[心臓障害]のgradingを考慮する
10034484	心臓障害	Pericarditis	心膜炎	症状はないが、心電図または理学所見(例: 摩擦音)が心膜炎を示す	症状のある心膜炎(例: 胸痛)	生理機能に影響する心膜炎(例: 収縮性心膜炎)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心外膜(心臓周囲の保護層)の層におよぶ炎症	-
10061541	心臓障害	Pulmonary valve disease	肺動脈弁疾患	症状のない弁肥厚(画像検査による軽度の逆流や狭窄の有無を問わない)	症状がない; 画像検査による中等度の逆流または狭窄	症状がある; 画像検査による高度の逆流または狭窄; 内科的治療によりコントロールできる	生命を脅かす; 緊急処置を要する(例: 弁置換術, 弁形成術)	死亡	肺動脈弁の機能や構造の欠陥を特徴とする異常	-
10040639	心臓障害	Sick sinus syndrome	洞不全症候群	症状がなく、治療を要さない	症状があるが、治療を要さない; 既に開始した薬物治療の変更を要する	症状があり、治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	失神、疲労、めまいを伴う、徐脈と心房頻拍が交互に現れるリズム不整	-
10040741	心臓障害	Sinus bradycardia	洞性徐脈	症状がなく、治療を要さない	症状があるが、治療を要さない; 既に開始した薬物治療の変更を要する	症状があり、治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心拍60回/分を下回る、洞結節に起因するリズム不整	-
10040752	心臓障害	Sinus tachycardia	洞性頻脈	症状がなく、治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要するが緊急性はない	緊急の内科的治療を要する	-	-	心拍100回/分を上回る、洞結節に起因するリズム不整	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10042604	心臓障害	Supraventricular tachycardia	上室性頻脈	症状がなく、治療を要さない	内科的治療を要するが緊急性はない	症状があり、緊急処置を要する	生命を脅かす	死亡	心拍100回/分を上回る、上室性のリズム不整	-
10061389	心臓障害	Tricuspid valve disease	三尖弁疾患	症状のない弁肥厚(軽度の逆流や狭窄の有無を問わない)	症状がない; 画像検査による中等度の逆流または狭窄	症状がある; 高度の逆流または狭窄; 内科的治療によりコントロールできる	生命を脅かす; 緊急処置を要する(例: 弁置換術, 弁形成術)	死亡	三尖弁の機能や構造の欠陥を特徴とする異常	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10047281	心臓障害	Ventricular arrhythmia	心室性不整脈	症状がなく, 治療を要さない	内科的治療を要するが緊急性はない	緊急処置を要する	生命を脅かす; 循環動態の悪化	死亡	心室に起因するリズム不整	-
10047290	心臓障害	Ventricular fibrillation	心室細動	-	-	-	生命を脅かす; 循環動態の悪化	死亡	協調した心室収縮がなく, 高速で反復する心筋線維の興奮のために識別可能なQRSが見られないリズム不整	-
10047302	心臓障害	Ventricular tachycardia	心室性頻脈	-	内科的治療を要するが緊急性はない	症状があり, 緊急処置を要する	生命を脅かす; 循環動態の悪化	死亡	心拍100回/分を超える, ヒス束遠位に起因するリズム不整	-
10010331	先天性, 家族性および遺伝性障害	Congenital, familial and genetic disorders - Other, specify	先天性, 家族性および遺伝性障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10013993	耳および迷路障害	Ear and labyrinth disorders - Other, specify	耳および迷路障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10014020	耳および迷路障害	Ear pain	耳痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	耳の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10065785	耳および迷路障害	External ear pain	外耳痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	外耳周囲の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10019245	耳および迷路障害	Hearing impaired	聴力障害	成人: 記録として残る聴力低下はないが聴力の自覚的な変化がある; 少なくとも片側の耳で2つ以上の隣接する周波数での平均聴力に15 - 25 dBの閾値変動がある(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオーディオグラム) 小児: (1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオーディオグラム) > 20 dBの閾値変動を伴う難聴(例: 25 dB HL以上); 少なくとも片側の聴力が > 4 kHz(例: 6または8 kHz)での感音難聴	成人: 補聴器を要さない聴力低下; 治療を要さない; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 少なくとも片側の耳で2つ以上の隣接する周波数での平均聴力に > 25 dBの閾値変動(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオーディオグラム) 小児: (1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオーディオグラム) 少なくとも片側の耳で4 kHzでの > 20 dBの閾値変動; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響	成人: 補聴器を要する聴力低下; 治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 少なくとも片側の耳で3つ以上の隣接する周波数での平均聴力に > 25 dBの閾値変動(1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオーディオグラム) 小児: (1, 2, 3, 4, 6, 8 kHzのオーディオグラム) 補聴器を含む治療介入を要する聴力低下; 少なくとも片側の耳で2- < 4 kHzでの > 20 dBの閾値変動; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響	成人: 日常生活で用をなさない聴力; 両側の顕著な聴力低下 (>=2 kHzで閾値の絶対値が > 80 dB) 小児: 聴覚医学的に見て人工内耳が必要と判断される; > 40 dBの聴力低下(例: 45 dB以上); 2 kHz以上での感音難聴	-	耳の構造の損傷の結果として、音を感じたり認知する力を、部分的または全体的に喪失した状態	
10065838	耳および迷路障害	Middle ear inflammation	中耳の炎症	漿液性中耳炎	内科的治療を要する漿液性中耳炎	乳様突起炎; 外耳道軟部組織や骨の壊死	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	中耳の炎症(炎症への生理的反応), 腫脹および発赤	
10043882	耳および迷路障害	Tinnitus	耳鳴	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	耳に雑音(リンリン, ザーザー, ウォーウォー, カチカチなど)を感じる病態	
10047340	耳および迷路障害	Vertigo	回転性めまい	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	本人の周囲がぐるぐる回っているような感覚(客観的めまい), または本人が空中で回っているような感覚(主観的めまい)	
10047386	耳および迷路障害	Vestibular disorder	前庭障害	-	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	めまい, 平衡感覚異常, 悪心, 視野の異常を特徴とする病態	
10001367	内分泌障害	Adrenal insufficiency	副腎機能不全	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	高度の症状; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	副腎皮質がコルチゾールや時にはアルドステロンを十分に産生しない状態。Addison病や原発性副腎不全症などの副腎皮質の異常を原因とする	
10011655	内分泌障害	Cushingoid	クッシング様症状	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	高度の症状; 内科的治療または入院を要する	-	-	クッシング病やクッシング症候群に似た徴候や症状。通常外因性の副腎皮質ステロイドによる野牛肩, 中心性肥満, 皮膚線条, 脂肪過多, 高血圧, 糖尿病, 骨粗鬆症など	

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10012205	内分泌障害	Delayed puberty	思春期遅発症	-	女性の場合: 13歳までに乳房発達がない; 男性の場合: 精巣容量が3 cc未満である, または14.5歳までにタナーの性成熟度判定の第2段階が起こらない	女性の場合: 14歳までに乳房発達がない; 男性の場合: 精巣容量の増加がない, または16歳までにタナーの性成熟度判定の第2段階が起こらない; ホルモン補充療法を要する	-	-	通常より遅い性成熟を特徴とする異常	-
10014698	内分泌障害	Endocrine disorders - Other, specify	内分泌障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10020705	内分泌障害	Hyperparathyroidism	副甲状腺機能亢進症	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	-	-	-	副甲状腺の副甲状腺ホルモン産生の亢進により, 高カルシウム血症(血中のカルシウムの異常高値)を来す病態	-
10020850	内分泌障害	Hyperthyroidism	甲状腺機能亢進症	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 甲状腺抑制治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 入院を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	体内の甲状腺ホルモンの過剰。よくある原因は甲状腺の機能亢進や甲状腺ホルモン薬の過量投与	-
10058359	内分泌障害	Hypogonadism	性腺機能低下	症状がないか軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	性腺からの性ホルモン産生の減少	-
10021041	内分泌障害	Hypoparathyroidism	副甲状腺機能低下症	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	高度の症状; 内科的治療または入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	副甲状腺の副甲状腺ホルモン産生の低下	-
10062767	内分泌障害	Hypophysitis	下垂体炎	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	下垂体の炎症や細胞浸潤	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10021067	内分泌障害	Hypopituitarism	下垂体機能低下症	症状がない,または軽度の症状;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	中等症;最小限/局所的/非侵襲的治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが,ただちに生命を脅かすものではない;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	下垂体ホルモン産生の減少	下垂体炎[内分泌障害]のgradingを考慮する
10021114	内分泌障害	Hypothyroidism	甲状腺機能低下症	症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	症状がある;甲状腺ホルモンの補充療法を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状;身の回りの日常生活動作の制限;入院を要する;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	甲状腺の甲状腺ホルモン産生の低下	下垂体炎[内分泌障害]のgradingを考慮する
10058084	内分泌障害	Precocious puberty	思春期早発症	女性8歳未満,男性9歳未満で;生化学検査所見を伴わない思春期発来の身体所見	女性8歳未満,男性9歳未満で;思春期発来の身体所見と生化学検査所見	-	-	-	年齢相応でない,二次性徴の早期発来を特徴とする異常。性成熟の開始が女児で8歳,男児で9歳より前に起きる	-
10067734	内分泌障害	Testosterone deficiency	テストステロン欠乏症	症状がない;軽度の症状があるが治療を要さない	補充療法を要する	-	-	-	テストステロンの低下	-
10043778	内分泌障害	Thyroiditis	甲状腺炎	症状がない	内科的治療を要する	入院を要する	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	甲状腺の炎症や組織破壊	-
10047488	内分泌障害	Virilization	男性化	軽度の症状;治療を要さない	中等度の症状;内科的治療を要する	-	-	-	女性や思春期前の男性に起きる不適切な男性化	-
10005886	眼障害	Blurred vision	霧視	治療を要さない	症状があり;中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下);身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	症状があり,顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満,0.1を超える,または既知のベースラインから3段階を超える視力低下);身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	不鮮明またはぼんやりした視覚	ぶどう膜炎[眼障害]のgradingを考慮する
10007739	眼障害	Cataract	白内障	症状がない;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	症状があり,中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下);グレア症状が身の回り以外の日常生活動作に影響がある;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	症状があり,顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満,0.1を超える,または既知のベースラインから3段階を超える視力低下);身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	片側または両側の水晶体レンズの部分的または完全な透明性の低下。視力の低下をきたし,治療しない場合は失明に至る	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10048492	眼障害	Corneal ulcer	角膜潰瘍	-	-	罹患眼の穿孔を伴わない角膜潰瘍	罹患眼の穿孔	-	角膜表面の表皮組織の欠失 角膜や前房への炎症性細胞浸潤を伴う	-
10011974	眼障害	Decreased night vision	夜間視力低下	症状がある	中等度の視力低下(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下);身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	顕著な視力低下(最高矯正視力0.5未満,0.1を超える,または既知のベースラインから3段階を超える視力低下);身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	薄暗い中で鮮明に見る機能の不全	-
10013774	眼障害	Dry eye	ドライアイ	臨床所見または検査所見のみ;潤滑剤で改善する症状	症状があり,中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下)	症状があり,顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満,0.1を超える,または既知のベースラインから3段階を超える視力低下);身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	角膜と結膜の乾燥	角膜潰瘍がある場合は,角膜潰瘍[眼障害]のgradingを考慮する CTCAEにない症候群(例:シェーグレン症候群など)によるもの場合は最も当てはまるSOCのその他(具体的に記載)として報告する
10015829	眼障害	Extraocular muscle paresis	外眼筋不全麻痺	症状がない;臨床所見または検査所見のみ	複視を伴わない片側麻痺	両側麻痺,正面注視では生じないが側方注視で生じる複視を伴う片側麻痺	中心部60°を超える物を見る際に頭部の回転を要する両側麻痺,または正面注視で複視を伴う	-	外眼筋の不全麻痺	-
10015919	眼障害	Eye disorders - Other, specify	眼障害,その他(具体的に記載)	症状がない,または軽度の症状;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない;視力に変化がない	中等症;最小限/局所的/非侵襲的治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限;最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが,ただちに視覚喪失をきたす可能性は高くない;身の回りの日常生活動作の制限;視力低下(最高矯正視力0.5未満,0.1を超える,または既知のベースラインから3段階を超える視力低下);年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	視覚喪失の可能性が高い状態;緊急処置を要する;罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	-	-
10015958	眼障害	Eye pain	眼痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛;身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	眼の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10061145	眼障害	Eyelid function disorder	眼瞼機能障害	臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	症状がある;非外科的処置を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する外科的な治療を要する;身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	眼瞼機能の低下	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10016757	眼障害	Flashing lights	光のちらつき	症状がある	身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	突然で短い光の閃光	網膜裂孔, 網膜剥離[眼障害]のgradingを考慮する
10016778	眼障害	Floaters	浮遊物	症状がある	身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	眼前に見える細かなスポット スポットは硝子体液内やレンズ内の不透明な細胞断片の影である	網膜裂孔, 網膜剥離[眼障害]のgradingを考慮する
10018304	眼障害	Glaucoma	緑内障	8 mmHg未満の眼圧上昇; 視野欠損はない	局所的治療を要する	眼圧上昇による視野欠損	罹患眼の中心部10°以内の視野欠損	-	眼球内の水分の流出障害による眼球内圧の上昇	-
10023332	眼障害	Keratitis	角膜炎	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があり, 中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下)	症状があり, 顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下); 角膜潰瘍; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	罹患眼の穿孔; 最高矯正視力0.1以下	-	眼の角膜の炎症	角膜潰瘍[眼障害]のgradingを考慮する
10061322	眼障害	Optic nerve disorder	視神経障害	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ	中等度の視力の低下(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下)	顕著な視力の低下(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	視神経(第2脳神経)の障害	-
10033703	眼障害	Papilledema	乳頭浮腫	症状がない; 視野欠損がない	症状があり, 中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下)	症状があり, 顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	視神経円板周囲の腫脹	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10054541	眼障害	Periorbital edema	眼窩周囲浮腫	軟らかいまたは非圧痕性浮腫	硬結があるまたは圧痕性の浮腫; 局所的治療を要する	視覚障害を伴う浮腫; 眼圧の上昇, 緑内障または網膜の出血;-利尿薬を要する; 外科的処置を要する	-	-	過剰な水分貯留による眼窩周囲の浮腫	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10034960	眼障害	Photophobia	羞明	症状がある	身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	光への恐怖感と忌避行動	-
10038848	眼障害	Retinal detachment	網膜剥離	-	-	黄斑部を除く裂孔原性網膜剥離	黄斑部剥離を伴う裂孔原性網膜剥離	-	内網膜層の色素上皮層からの離開	-
10038897	眼障害	Retinal tear	網膜裂孔	網膜剥離がなく治療を要さない	網膜剥離はないが治療を要する	-	-	-	網膜の小さな裂孔。ちらつきや飛蚊症を伴う	網膜剥離がある場合, 網膜剥離[眼障害]もgradingする

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10038901	眼障害	Retinal vascular disorder	網膜血管障害	-	血管新生を伴わない網膜血管障害	血管新生を伴う網膜血管障害	-	-	視力に悪影響を及ぼす病的な網膜血管新生	硝子体出血がある場合、硝子体出血[眼障害]も報告する
10038923	眼障害	Retinopathy	網膜症	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ	症状があり、中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	症状があり、顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	網膜の障害	硝子体出血がある場合、硝子体出血[眼障害]も報告する
10061510	眼障害	Scleral disorder	強膜障害	ベースラインから視力に変化がない	症状があり、中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	症状があり、顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	眼の強膜の障害	-
10046851	眼障害	Uveitis	ぶどう膜炎	わずかな(trace)炎症細胞浸潤を伴う前部ぶどう膜炎	1+~2+の炎症細胞浸潤を伴う前部ぶどう膜炎	3+以上の炎症細胞浸潤を伴う前部ぶどう膜炎; 中等度の後部または全ぶどう膜炎	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	眼のぶどう膜炎の炎症	-
10047516	眼障害	Vision decreased	視覚低下	-	中等度の視力の低下(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下)	顕著な視力の低下(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	視力の低下	原因が特定できる場合は、より具体的なAE termを用いる ぶどう膜炎[眼障害]のgradingを考慮する
10047656	眼障害	Vitreous hemorrhage	硝子体出血	治療を要さない	症状があり、中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	症状があり、顕著な視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下); 身の回りの日常生活動作の制限; 硝子体切除を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	硝子体液の中への出血	-
10047848	眼障害	Watering eyes	流涙	治療を要さない	症状があり、中等度の視力の低下を伴う(最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下)	顕著な視力の低下(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える, または既知のベースラインから3段階を超える視力低下)	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	過度の流涙。涙液の過剰産生または涙管の排液障害による	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10000060	胃腸障害	Abdominal distension	腹部膨満	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の不快感; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	腹部の膨隆	-
10000081	胃腸障害	Abdominal pain	腹痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	腹部の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10002153	胃腸障害	Anal fissure	裂肛	症状がない	症状がある	侵襲的治療を要する	-	-	肛門粘膜の断裂	-
10002156	胃腸障害	Anal fistula	痔瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	肛門管腔と肛門周囲皮膚との間の病的な交通	-
10065721	胃腸障害	Anal mucositis	肛門粘膜炎	症状がない、または軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	肛門粘膜の潰瘍や炎症	Grade 4とGrade 5は肛門潰瘍[胃腸障害]として報告する
10065722	胃腸障害	Anal necrosis	肛門壊死	-	-	TPNまたは入院を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	肛門部に生じた壊死	-
10002167	胃腸障害	Anal pain	肛門痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	肛門の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10002176	胃腸障害	Anal stenosis	肛門狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	症状があり、消化管機能に高度の変化がある; 非緊急の外科的処置を要する; TPNまたは入院を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	肛門管の内腔の狭小化	-
10002180	胃腸障害	Anal ulcer	肛門潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	肛門管の粘膜面の、限局性のびらん性病変	-
10003445	胃腸障害	Ascites	腹水	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療または穿刺排液を要する	高度の症状; カテーテル留置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	腹腔内の漿液性または血性の液体貯留	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10004222	胃腸障害	Belching	おくび	ベースラインから増加	治療を要する(市販薬を含む)	-	-	-	口から音を立ててガスを出す	シノニム: げっぷ/Burping
10005265	胃腸障害	Bloating	腹部膨満感	腸管の機能や経口摂取に変化なし	症状がある; 経口摂取の低下; 腸管機能の変化	-	-	-	腹部の自覚的な不快な膨満感	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065747	胃腸障害	Cecal hemorrhage	盲腸出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	盲腸からの出血	-
10008417	胃腸障害	Cheilitis	口唇炎	臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 治療を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	口唇の炎症	-
10009167	胃腸障害	Chylous ascites	乳び性腹水	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する(例: 脂肪制限食); 穿刺またはチューブドレナージを要する	高度の症状; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	腹腔内の乳び貯留	-
10009887	胃腸障害	Colitis	大腸炎	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	腹痛; 粘液または血液が便に混じる	高度の腹痛; 腹膜刺激症状	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	大腸の炎症	-
10009995	胃腸障害	Colonic fistula	結腸瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	大腸と、他の臓器や解剖学的部位との間に生じた病的な交通	-
10010000	胃腸障害	Colonic obstruction	結腸閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	入院を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	結腸の腸内容の正常な流れの途絶	-
10010001	胃腸障害	Colonic perforation	結腸穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	結腸壁の破裂	大腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10010004	胃腸障害	Colonic stenosis	結腸狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	結腸の内腔の狭小化	-
10010006	胃腸障害	Colonic ulcer	結腸潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	結腸の粘膜面の、限局性のびらん性病変	-
10010774	胃腸障害	Constipation	便秘	不定期または間欠的な症状; 便軟化薬/緩下薬/食事の工夫/浣腸を不定期に使用	緩下薬または浣腸の定期的使用を要する持続的症狀; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	排便を要する頑固な便秘; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	腸管内容の排出が不定期で頻度が減少、または困難な状態	-
10012318	胃腸障害	Dental caries	齲歯	歯根部に及ばない齲歯	歯根部に及ぶ齲歯	歯髄炎または歯根尖周囲の膿瘍や歯の欠失に至る齲歯	-	-	歯の腐食であり、歯が軟化、変色したり、穴が開く状態	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10012727	胃腸障害	Diarrhea	下痢	便の固さや排便回数の変化	ベースラインと比べて4-6回/日の排便回数増加; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の中等度増加; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 便の固さや排便回数の変化の年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加; 入院を要する; ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の高度増加; 静脈内投与による治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	排便頻度の増加や軟便または水様便の排便	結腸炎, 腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10013781	胃腸障害	Dry mouth	口内乾燥	症状があるが(例: 口内乾燥や唾液の濃縮), 顕著な摂食習慣の変化がない; 刺激のない状態での唾液分泌が>0.2 mL/min	中等度の症状; 経口摂取の変化(例: 多量の水, 潤滑剤, ピューレ状および/または軟らかく水分の多い食物に限られる); 刺激のない状態での唾液分泌量が0.1-0.2 mL/min	十分な経口摂取が不可能; 経管栄養またはTPNを要する; 刺激のない状態での唾液分泌量が<0.1 mL/min	-	-	口腔内の唾液分泌の低下	CTCAEにない症候群(例: シェーグレン症候群など)によるもの場合は最も当てはまるSOCのその他(具体的に記載)として報告する
10013828	胃腸障害	Duodenal fistula	十二指腸瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	十二指腸と, 他の臓器や解剖学的部位との間に生じた病的な交通	-
10055242	胃腸障害	Duodenal hemorrhage	十二指腸出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	十二指腸からの出血	腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10013830	胃腸障害	Duodenal obstruction	十二指腸閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	入院を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃内容の十二指腸での正常な流れの途絶	-
10013832	胃腸障害	Duodenal perforation	十二指腸穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	十二指腸壁の破裂	腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10050094	胃腸障害	Duodenal stenosis	十二指腸狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的な外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	十二指腸の内腔の狭小化	-
10013836	胃腸障害	Duodenal ulcer	十二指腸潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的な侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	十二指腸の粘膜面の, 限局性のびらん性病変	-
10013946	胃腸障害	Dyspepsia	消化不良	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	高度の症状; 外科的処置を要する	-	-	不快な, しばしば痛みのある胃の感覚で, 不十分な消化の結果生じる。胃の焼灼感, 膨満感, 胸焼け, 悪心, 嘔吐の症状を呈する	胃炎, 胃不全麻痺[胃腸障害]のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10013950	胃腸障害	Dysphagia	嚥下障害	症状があるが、通常食の摂取が可能	症状があり、摂食/嚥下に変化がある	摂食/嚥下に高度の変化がある; 経管栄養/TPN/入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	嚥下が困難である状態	-
10014893	胃腸障害	Enterocolitis	腸炎	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	腹痛; 粘液または血液が便に混じる	高度で持続的な腹痛; 発熱; 腸閉塞; 腹膜刺激症状	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	小腸と大腸の炎症	結腸の既知の異常を記録/報告する場合は大腸炎[胃腸障害]を用いる 診断が確定した感染を記録/報告する場合は感染性小腸結腸炎[感染症および寄生虫症]を用いる
10062570	胃腸障害	Enterovesical fistula	腸膀胱瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膀胱と腸管との間に生じた病的な交通	-
10065851	胃腸障害	Esophageal fistula	食道瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膀胱と腸管との間に生じた病的な交通	-
10015384	胃腸障害	Esophageal hemorrhage	食道出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	食道と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10065727	胃腸障害	Esophageal necrosis	食道壊死	-	-	消化管から十分な栄養を摂取できない; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	食道壁に生じた壊死	-
10015387	胃腸障害	Esophageal obstruction	食道閉塞症	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する; 侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	食道内容の正常な流れの途絶	-
10015388	胃腸障害	Esophageal pain	食道痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	食道領域の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10055472	胃腸障害	Esophageal perforation	食道穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	食道壁の破裂	-
10015448	胃腸障害	Esophageal stenosis	食道狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的な外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	食道の内腔の狭小化	-
10015451	胃腸障害	Esophageal ulcer	食道潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的な侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	食道壁の粘膜面の, 限局性のびらん性病変	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10015453	胃腸障害	Esophageal varices hemorrhage	食道静脈瘤出血	-	自然軽快する; 治療を要さない	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	食道静脈瘤からの出血	-
10015461	胃腸障害	Esophagitis	食道炎	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 摂食/嚥下の変化; 経口栄養補給を要する	摂食/嚥下の高度の変化; 経管栄養/TPN/入院を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	食道壁の炎症	-
10016296	胃腸障害	Fecal incontinence	便失禁	時にパッドの使用が必要	毎日パッドの使用が必要	高度の症状; 待機的外科的処置を要する	-	-	直腸からの便の漏れを制御できない状態	-
10016766	胃腸障害	Flatulence	鼓腸	軽度の症状; 治療を要さない	中等症; 持続的; 社会心理学的な影響がある	-	-	-	下部消化管の過剰なガスの貯溜	-
10065713	胃腸障害	Gastric fistula	胃瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胃と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10017789	胃腸障害	Gastric hemorrhage	胃出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胃壁からの出血	-
10051886	胃腸障害	Gastric necrosis	胃壊死	-	-	消化管から十分な栄養を摂取できない; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃壁に生じた壊死	-
10017815	胃腸障害	Gastric perforation	胃穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃壁の破裂	-
10061970	胃腸障害	Gastric stenosis	胃狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃の内腔の狭小化	-
10017822	胃腸障害	Gastric ulcer	胃潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃壁の粘膜面の限局性のびらん性病変	-
10017853	胃腸障害	Gastritis	胃炎	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 内科的治療を要する	摂食または胃機能の高度の変化; TPNまたは入院を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃の炎症	-
10066874	胃腸障害	Gastroesophageal reflux disease	胃食道逆流性疾患	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	高度の症状; 外科的処置を要する	-	死亡	胃や十二指腸内容の食道遠位側への逆流。本来慢性的なもので通常下部食道括約筋の機能不全を原因とし、食道粘膜の損傷を招く。胸焼けや消化不良の症状がある	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10017947	胃腸障害	Gastrointestinal disorders - Other, specify	胃腸障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10017877	胃腸障害	Gastrointestinal fistula	胃腸管瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胃腸のいずれかの部位と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10017999	胃腸障害	Gastrointestinal pain	消化器痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	胃腸領域の著しく不快な感覚	結腸炎, 腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10018043	胃腸障害	Gastroparesis	胃不全麻痺	軽度の悪心, 早期の満腹感, 鼓腸, 通常食でのカロリー摂取の維持が可能	中等度の症状; 食事や生活習慣の工夫で栄養を維持することができる; 薬学的介入を要する	ベースラインから>=20%の体重減少; 経管栄養またはTPNを要する; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	-	胃壁の筋の不全麻痺で, 胃内容の小腸への排出遅延を生じる	-
10018286	胃腸障害	Gingival pain	歯肉痛	軽度の疼痛	経口摂取に支障がある中等度の疼痛	高度の疼痛; 経口摂取が不可能	-	-	歯肉領域の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10019418	胃腸障害	Hematemesis	吐血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	血液の嘔吐	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10060544	胃腸障害	Hematochezia	血便排泄	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	新鮮血の肛門の通過。通常, 便に含まれるか便を伴う	結腸炎, 腸炎, 直腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10060640	胃腸障害	Hemorrhoidal hemorrhage	痔出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	痔核からの出血	-
10019611	胃腸障害	Hemorrhoids	痔核	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 痔バンドの使用または内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	-	-	直腸と直腸周囲に拡張した静脈が存在	-
10065728	胃腸障害	Ileal fistula	回腸瘻	症状がない	症状がある; 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	回腸と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10055287	胃腸障害	Ileal hemorrhage	回腸出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	回腸壁からの出血	腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065730	胃腸障害	Ileal obstruction	回腸閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 経鼻胃管を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する; 侵襲的治療を要する; イレウス管を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	回腸での腸内容の正常な流れの途絶	-
10021305	胃腸障害	Ileal perforation	回腸穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	回腸壁の破裂	腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10021307	胃腸障害	Ileal stenosis	回腸狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	回腸内腔の狭小化	-
10021309	胃腸障害	Ileal ulcer	回腸潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	回腸の粘膜表面の限局性のびらん性病変	-
10021328	胃腸障害	Ileus	イレウス	症状がなく画像所見のみ	症状がある; 消化管機能の変化; 消化管の安静を要する	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; チューブ挿入を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	回腸が腸管内容を輸送することができない	-
10055291	胃腸障害	Intra-abdominal hemorrhage	腹腔内出血	-	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	輸血を要する; 侵襲的治療を要する; 入院を要する	死亡	腹腔内の出血	-
10065719	胃腸障害	Jejunal fistula	空腸瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	空腸と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10055300	胃腸障害	Jejunal hemorrhage	空腸出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	空腸壁からの出血	腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10065732	胃腸障害	Jejunal obstruction	空腸閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する; 侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	空腸での腸内容の正常な流れの途絶	-
10023174	胃腸障害	Jejunal perforation	空腸穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	空腸壁の破裂	腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10023176	胃腸障害	Jejunal stenosis	空腸狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	空腸内腔の狭小化	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10023177	胃腸障害	Jejunal ulcer	空腸潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	空腸の粘膜表面の限局性のびらん性病変	-
10024561	胃腸障害	Lip pain	口唇痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への高度の影響(小児)	-	死亡	口唇の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10025476	胃腸障害	Malabsorption	吸収不良	-	食事の変化; 内服治療を要する	消化管から十分な栄養を摂取できない; TPNを要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	小腸での不十分な栄養吸収。腹部の著しい不快感, 鼓腸, 下痢の症状がある	-
10027162	胃腸障害	Melena	メレナ	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	黒色のタール様の便	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10028130	胃腸障害	Mucositis oral	口腔粘膜炎	症状がない, または軽度の症状; 治療を要さない	経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍; 食事の変更を要する	高度の疼痛; 経口摂取に支障がある	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	口腔粘膜の潰瘍または炎症	-
10028813	胃腸障害	Nausea	悪心	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少, 脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少; 静脈内投与による治療を要する	カロリーや水分の経口摂取が不十分; 経管栄養/TPN/入院を要する	-	-	ムカムカ感や嘔吐の衝動	腸炎, 胃炎[胃腸障害]および/または副腎機能不全, 下垂体炎[内分泌障害]のgradingを考慮する
10029957	胃腸障害	Obstruction gastric	胃閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する; 侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃内容の正常な流れの途絶	-
10065720	胃腸障害	Oral cavity fistula	口腔瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	口腔と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10054520	胃腸障害	Oral dysesthesia	口腔知覚不全	軽度の不快感; 経口摂取に支障がない	中等度の疼痛; 経口摂取に支障がある	経口摂取不能の疼痛; 経管栄養またはTPNを要する	-	-	口唇, 舌または口全体の灼熱感またはビリビリとする感覚	-
10030980	胃腸障害	Oral hemorrhage	口腔内出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	口腔からの出血	-
10031009	胃腸障害	Oral pain	口腔内痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への高度の影響(小児)	-	-	口, 舌, 口唇の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065703	胃腸障害	Pancreatic duct stenosis	膵管狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的な外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	膵管内腔の狭小化	-
10049192	胃腸障害	Pancreatic fistula	膵瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膵臓と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10033626	胃腸障害	Pancreatic hemorrhage	膵臓出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膵臓からの出血	-
10033628	胃腸障害	Pancreatic insufficiency	膵機能不全	症状がなく、膵酵素が基準範囲下限未満	排便回数/排便量/便臭の増加; 脂肪便	吸収障害に続発する症状	-	-	膵外分泌酵素の産生低下に伴う膵外分泌機能障害	-
10058096	胃腸障害	Pancreatic necrosis	膵壊死	-	-	経管栄養またはTPNを要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	膵臓に生じた壊死	-
10033645	胃腸障害	Pancreatitis	膵炎	-	画像所見のみ	高度の疼痛; 嘔吐; 内科的治療を要する(例: 鎮痛や栄養の補助)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膵感染を伴わないと判断される膵臓の炎症	-
10034536	胃腸障害	Periodontal disease	歯周病	歯肉後退または歯肉炎; 探針による局所的出血; 軽度の局所的骨欠損	中等度の歯肉後退または歯肉炎; 探針による複数箇所の出血; 中等度の骨欠損	自然出血; 歯欠損の有無によらない高度の骨欠損; 上顎骨または下顎骨の骨壊死	-	-	歯の周囲の歯肉組織の疾患	-
10065704	胃腸障害	Peritoneal necrosis	腹膜壊死	-	-	経管栄養またはTPNを要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	腹膜に生じた壊死	-
10036774	胃腸障害	Proctitis	直腸炎	直腸に不快感があるが治療を要さない	症状がある(例: 直腸の不快感, 血液や粘液の流出); 便秘切迫または便秘; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	直腸の炎症	便秘(胃腸障害)のgradingを考慮する
10064993	胃腸障害	Rectal fissure	直腸裂	症状がない	症状がある	侵襲的治療を要する	-	-	直腸粘膜の断裂	-
10038062	胃腸障害	Rectal fistula	直腸瘻	症状がない	症状がある; 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	直腸と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10063190	胃腸障害	Rectal mucositis	直腸粘膜炎	症状がない, または軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	直腸の潰瘍または粘膜の炎症	-
10065709	胃腸障害	Rectal necrosis	直腸壊死	-	-	経管栄養またはTPNを要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	直腸壁に生じた壊死	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065707	胃腸障害	Rectal obstruction	直腸閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する; 侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	直腸での腸内容の正常な流れの途絶	-
10038072	胃腸障害	Rectal pain	直腸痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	直腸領域の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10038073	胃腸障害	Rectal perforation	直腸穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	直腸壁の破裂	-
10038079	胃腸障害	Rectal stenosis	直腸狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	消化管機能の高度の変化; 経管栄養または入院を要する; 待機的な外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	直腸内腔の狭小化	-
10038080	胃腸障害	Rectal ulcer	直腸潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化(例: 食事習慣の変化, 嘔吐, 下痢)	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的な侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	直腸の粘膜面の限局性のびらん性病変	-
10038981	胃腸障害	Retroperitoneal hemorrhage	後腹膜出血	-	自然軽快する; 治療を要する	入院を要する	輸血を要する; 侵襲的治療を要する; 入院を要する	死亡	後腹膜領域からの出血	-
10056681	胃腸障害	Salivary duct inflammation	唾液管の炎症	わずかな唾液の濃縮; わずかな味覚の変化(例: 金属味)	濃い, ねばつく, ベトベトとする唾液; 顕著な味覚の変化; 食事の変更を要する; 唾液分泌関連症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	急性唾液腺壊死; 高度の唾液分泌関連症状(例: 濃縮した唾液/口腔内分泌物またはのどが詰まる); 経管栄養またはTPNを要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	唾液管の炎症	-
10039411	胃腸障害	Salivary gland fistula	唾液腺瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	唾液腺と他の臓器や解剖学的部位との病的な交通	-
10065710	胃腸障害	Small intestinal mucositis	小腸粘膜炎	症状がない, または軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 経口摂取に支障がある; 経管栄養/TPN/入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	小腸の粘膜の潰瘍または炎症	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10041101	胃腸障害	Small intestinal obstruction	小腸閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する; 侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	小腸での腸内容の正常な流れの途絶	-
10041103	胃腸障害	Small intestinal perforation	小腸穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	小腸壁の破裂	腸炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10062263	胃腸障害	Small intestinal stenosis	小腸狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化	症状があり; 消化管機能に高度の変化がある; 経管栄養/TPN/入院を要する; 非緊急の外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	小腸内腔の狭小化	-
10041133	胃腸障害	Small intestine ulcer	小腸潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	消化管機能の高度の変化; TPNを要する; 待機的侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	小腸の粘膜面の限局性のびらん性病変	-
10042112	胃腸障害	Stomach pain	胃痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	胃の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10044030	胃腸障害	Tooth development disorder	歯の発育障害	症状がない; 歯やエナメル質の低形成	口腔内手術にて矯正可能な障害	口腔内手術にて矯正可能ではない障害を伴う形成異常; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	歯の発育期に発生する歯の病的な形成	-
10044031	胃腸障害	Tooth discoloration	歯の変色	表面の着色	-	-	-	-	歯の色合いや濃淡の変化	-
10044055	胃腸障害	Toothache	歯痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	歯の著しく不快な感覚	-
10045271	胃腸障害	Typhlitis	盲腸炎	-	-	症状がある(例: 腹痛, 発熱, イレウスを伴う腸管運動の変化); 腹膜刺激症状	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	好中球減少がある患者に生じる壊死性腸炎。好中球減少性腸炎, 回盲部症候群, 虫垂炎とも呼ばれる	クロストリディオイデス・ディフィシル(c.diff, c. difficile)感染症を含む 好中球数減少-[臨床検査]も報告する 盲腸感染[感染症および寄生虫症]のgradingも考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10055356	胃腸障害	Upper gastrointestinal hemorrhage	上部消化管出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	上部消化管(口腔, 咽頭, 食道, 胃)からの出血	-
10054692	胃腸障害	Visceral arterial ischemia	内臓動脈虚血	-	内科的に管理でき, 永続的障害を残さない短時間(<24時間)の虚血症状	持続的(>=24時間)または再発性の症状および/または侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 重要臓器障害がある; 緊急の外科的処置を要する	死亡	内臓(腸間膜)動脈の狭窄や閉塞による血液供給の低下	-
10047700	胃腸障害	Vomiting	嘔吐	治療を要さない	外来での静脈内輸液の開始を要する; 内科的治療を要する	経管栄養の開始/TPN/入院を要する	生命を脅かす	死亡	胃内容が口から逆流性に排出されること	腸炎, 胃炎[胃腸障害]および/または副腎機能不全, 下垂体炎[内分泌障害]のgradingを考慮する
10008531	一般・全身障害および投与部位の状態	Chills	悪寒	軽度の寒さ; 震え; 歯がガチガチなる	中等度の全身の震え; 麻薬性薬剤を要する	高度または持続的で, 麻薬性薬剤が無効	-	-	発熱後の発汗に対する生理的反応としてしばしばみられる寒気	注入に伴う反応[傷害, 中毒および処置合併症]のgradingを考慮する
10011912	一般・全身障害および投与部位の状態	Death neonatal	新生児死亡	-	-	-	新生児の死亡	-	生後28日以内の新生児の死亡	-
10011914	一般・全身障害および投与部位の状態	Death NOS	死亡NOS	-	-	-	-	死亡	CTCAE用語のGrade 5に分類できない死亡	死亡の原因が有害事象である場合(例: 心停止[心臓障害]), 当該有害事象のGrade 5として報告する
10061818	一般・全身障害および投与部位の状態	Disease progression	疾患進行	-	-	-	-	死亡	CTCAE用語のGrade 5に分類できない疾患進行による死亡	死亡の原因が有害事象である場合(例: 心停止[心臓障害]), 当該有害事象のGrade 5として報告する
10014222	一般・全身障害および投与部位の状態	Edema face	顔面浮腫	限局する浮腫	限局する中等度の浮腫; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の腫脹; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	顔面領域の組織への過剰な水分貯留による腫脹	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10016059	一般・全身障害および投与部位の状態	Facial pain	顔面痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	顔面の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10016256	一般・全身障害および投与部位の状態	Fatigue	疲労	休息により軽快する疲労	休息によって軽快しない疲労; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	休息によって軽快しない疲労で, 身の回りの日常生活動作の制限を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	日常生活の遂行に十分なエネルギーが明らかに不足し, 全身的に弱くなった状態	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10016558	一般・全身障害および投与部位の状態	Fever	発熱	38.0 - 39.0°C (100.4 - 102.2°F)	> 39.0 - 40.0°C (102.3 - 104.0°F)	> 40.0°C (> 104.0°F) が <= 24 時間持続	> 40.0°C (> 104.0°F) が > 24 時間持続	死亡	基準範囲上限を超える体温の上昇	これは1つの指針であり, gradingには部位, 機器, 測定方法に基づいて調整した体幹温度を用いる 注入に伴う反応(傷害, 中毒および処置合併症)のgradingを考慮する
10016791	一般・全身障害および投与部位の状態	Flu like symptoms	インフルエンザ様症状	軽度のインフルエンザ様症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	インフルエンザ患者にみられる症状と類似した一連の症状。発熱, 悪寒, 身体の痛み, 倦怠感, 食欲不振, 乾性咳嗽を含む	シノニム: インフルエンザ/Flu, インフルエンザ/Influenza 注入に伴う反応(傷害, 中毒および処置合併症)のgradingを考慮する
10017577	一般・全身障害および投与部位の状態	Gait disturbance	歩行障害	軽度の歩行の変化(例: 両脚を広く開く, 跛行, 脚を引きずる)	中等度の歩行の変化(例: 両脚を広く開く, 跛行, 脚を引きずる); 補助器具を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	歩行困難	-
10018065	一般・全身障害および投与部位の状態	General disorders and administration site conditions - Other, specify	一般・全身障害および投与部位の状態, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10018112	一般・全身障害および投与部位の状態	Generalized edema	全身性浮腫	診察で明らか; 1+の圧痕浮腫	内服治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作に支障がある; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作に支障がある; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児); 静脈内投与による治療を要する; 皮膚の離開	生命を脅かす	-	皮膚を含む体組織に水分が貯留している状態	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10021113	一般・全身障害および投与部位の状態	Hypothermia	低体温	-	35 - > 32°C; 95 - > 89.6°F	32 - > 28°C; 89.6-82.4°F	<= 28°C (82.4°F); 生命を脅かす(例: 昏睡, 血圧低下, 肺水腫, 酸血症, 心室細動)	死亡	異常な低体温。35°C以下の体温の際は治療を要する	-
10064774	一般・全身障害および投与部位の状態	Infusion site extravasation	注入部位溢出	疼痛を伴わない浮腫	症状を伴う紅斑(例: 浮腫, 疼痛, 硬結, 静脈炎)	潰瘍または壊死; 高度の組織損傷; 外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	注射部位から周囲組織への溢出。注射部位の硬結, 紅斑, 腫脹, 熱感, 著しい不快感などを伴い得る	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10022095	一般・全身障害および投与部位の状態	Injection site reaction	注射部位反応	関連症状(例: 熱感, 紅斑, そう痒)を伴う/伴わない圧痛	疼痛; 脂肪変性; 浮腫; 静脈炎	潰瘍または壊死; 高度の組織損傷; 外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	注射部位に生じる(通常は免疫学的な)強い有害反応	-
10062466	一般・全身障害および投与部位の状態	Localized edema	限局性浮腫	限局性で障害や機能低下を伴わない	中等度の限局性浮腫で治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の限局性浮腫で治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	特定の解剖学的部位における過剰な水分貯留による腫脹	このAE termを用いる前に以下の特定の部位の浮腫および/または原因のgradingを考慮する: 心不全[心臓障害], 顔面浮腫, 末梢性浮腫[一般・全身障害および投与部位の状態], 脳浮腫[神経系障害], 喉頭浮腫, 肺水腫[呼吸器, 胸郭および縦隔障害], 眼窩周囲浮腫[眼障害], リンパ浮腫[血管障害] 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10025482	一般・全身障害および投与部位の状態	Malaise	倦怠感	だるさがある, または元気がない	身の回り以外の日常生活動作を制限するだるさがある, または元気がない状態; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作を制限するだるさがある, または元気がない状態; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	全身的な不快感, だるさ, 元気がない	-
10028154	一般・全身障害および投与部位の状態	Multi-organ failure	多臓器不全	-	-	高窒素血症と酸塩基平衡障害を伴うショック; 顕著な凝固障害	生命を脅かす(例: 血管収縮薬を要する, 乏尿/無尿/虚血性腸炎/乳酸アシドーシス)	死亡	肺機能, 肝機能, 腎機能, 凝固機能の進行性の悪化	-
10062501	一般・全身障害および投与部位の状態	Non-cardiac chest pain	非心臓性胸痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	心疾患に起因しない胸部不快感	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10033371	一般・全身障害および投与部位の状態	Pain	疼痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	著しく不快な感覚, 苦痛, 苦悶	このAE termを用いる前に, 身体の特定の部位の疼痛を表すtermを検討する(CTCAEには40を超える異なる疼痛のtermがある) 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10034570	一般・全身障害および投与部位の状態	Peripheral edema	末梢性浮腫	腫脹または解剖学的構造が不明瞭になっていることが注意深い診察でわかる	解剖学的構造が不明瞭になっていることが診察で容易にわかる; 皮膚の皸の消失; 解剖学的な輪郭の異常が容易にわかる; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	解剖学的な輪郭の異常が著明である; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	身体末梢への過剰な水分貯留による腫脹	心不全[心臓障害]のgradingを考慮する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10051986	一般・全身障害および投与部位の状態	Pneumatosis	気腫	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	高度の症状; 外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	腸管壁内のガスの所見	-
10042435	一般・全身障害および投与部位の状態	Sudden death NOS	突然死NOS	-	-	-	-	死亡	CTCAE用語のGrade 5に分類できない予期されない死亡	死亡の原因が有害事象である場合(例: 心停止[心臓障害]), 当該有害事象のGrade 5として報告する
10069480	一般・全身障害および投与部位の状態	Vaccination site lymphadenopathy	ワクチン接種部位リンパ節腫脹	局所的なリンパ節腫大	限局性潰瘍; 広汎なリンパ節腫大	-	-	-	ワクチン接種後のリンパ節腫大	-
10051341	肝胆道系障害	Bile duct stenosis	胆管狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; <24時間の静脈内輸液を要する	消化管機能の高度の変化; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胆管の内腔狭窄	-
10004665	肝胆道系障害	Biliary fistula	胆管瘻	-	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	他臓器または解剖学的部位と胆管の病的な交通	-
10084247	肝胆道系障害	Biliary obstruction	胆道閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; <24時間の静脈内輸液を要する	症状があり、消化管機能の高度の変化; 入院を要する; 非緊急の外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胆汁の正常な流出の途絶	-
10006537	肝胆道系障害	Budd-Chiari syndrome	バッドキアリ症候群	-	内科的治療を要する	重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 羽ばたき振戦; 軽度の脳症	生命を脅かす; 中等度から高度の脳症; 昏睡	死亡	肝静脈の閉塞があり、典型的には腹痛、腹水、肝腫大を呈する	-
10008612	肝胆道系障害	Cholecystitis	胆嚢炎	-	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胆嚢の炎症。胆石に起因し得る	-
10017631	肝胆道系障害	Gallbladder fistula	胆嚢瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	他臓器または解剖学的部位と胆嚢の病的な交通	-
10059446	肝胆道系障害	Gallbladder necrosis	胆嚢壊死	-	-	-	生命を脅かす; 緊急の侵襲的治療を要する	死亡	胆嚢に生じた壊死	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10017636	肝胆道系障害	Gallbladder obstruction	胆嚢閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 消化管機能の変化; <24時間の静脈内輸液を要する	症状があり, 消化管機能に高度の変化がある; 入院を要する; 非緊急の外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胆嚢内容の正常な流出の途絶	
10017638	肝胆道系障害	Gallbladder pain	胆嚢痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	胆嚢周辺の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10017639	肝胆道系障害	Gallbladder perforation	胆嚢穿孔	-	-	-	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胆嚢壁の破裂	-
10019663	肝胆道系障害	Hepatic failure	肝不全	-	-	羽ばたき振戦; 軽度の脳症; 薬物性肝障害; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 中等度から高度の脳症; 昏睡	死亡	肝臓における体内物質の代謝不全。血液検査でアンモニア, ビリルビン, LDH, ALP, AST, ALT, プロトロンビン時間(INR)が異常値を示す。Hy's Lawに該当する薬物性肝障害	-
10019678	肝胆道系障害	Hepatic hemorrhage	肝出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	肝臓からの出血	-
10019692	肝胆道系障害	Hepatic necrosis	肝壊死	-	-	-	生命を脅かす; 緊急の侵襲的治療を要する	死亡	肝実質に生じる壊死	-
10019705	肝胆道系障害	Hepatic pain	肝臓痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	肝周辺の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10019717	肝胆道系障害	Hepatitis	肝炎	-	中等度の症状; 内科的治療を要する	症状がある肝機能障害; 代償性肝硬変; 入院または入院期間の延長を要する	生命を脅かす; 高度な非代償性肝硬変(例: 凝固障害, 脳症, 昏睡)	死亡	肝臓の炎症	ウイルス性肝炎[感染症および寄生虫症], 肝不全(肝胆道系障害のgradingを考慮する自己免疫性肝炎は肝胆道系障害, その他(具体的に記載)として報告する
10019805	肝胆道系障害	Hepatobiliary disorders - Other, specify	肝胆道系障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10034405	肝胆道系障害	Perforation bile duct	胆管穿孔	-	-	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	肝外胆管または肝内胆管の壁の破裂	-
10036200	肝胆道系障害	Portal hypertension	門脈圧亢進症	-	門脈血流の低下	門脈血流の逆流; 静脈瘤および/または腹水を伴う	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	門脈圧の上昇	-
10036206	肝胆道系障害	Portal vein thrombosis	門脈血栓症	-	治療を要さない	内科的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	門脈内の塞栓(血栓)形成	-
10063675	肝胆道系障害	Sinusoidal obstruction syndrome	類洞閉塞症候群	-	血中ビリルビン2 - 5 mg/dL; 軽い(minor)治療を要する(例: 血液製剤, 利尿薬, 酸素)	血中ビリルビン>5 mg/dL; 凝固系を調整する薬剤を要する(例: デフィプロタイド); エコーで確認される逆流	生命を脅かす(例: 人工呼吸, 血漿交換, 腹膜ドレナージ)	死亡	肝臓血管の炎症および/または閉塞による高度の肝障害	-
10001718	免疫系障害	Allergic reaction	アレルギー反応	全身の治療を要さない	内服治療を要する	気管支痙攣; 続発症により入院を要する; 静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	抗原物質への曝露により生じる全身の有害反応	注入による場合は, 注入に伴う反応[傷害, 中毒および処置合併症]のgradingを考慮する ワクチン接種による場合は, 予防接種後全身反応[傷害, 中毒および処置合併症]のgradingを考慮する アレルギー反応と注入に伴う反応または予防接種後全身反応の両方を報告しない
10002218	免疫系障害	Anaphylaxis	アナフィラキシー	-	-	蕁麻疹の有無によらず症状のある気管支痙攣; 非経口的治療を要する; アレルギーによる浮腫/血管性浮腫; 血圧低下	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	肥満細胞からのヒスタミンやヒスタミン様物質の放出により引き起こされる急性炎症反応を特徴とする過剰な免疫反応。臨床的には, 呼吸困難, めまい, 血圧低下, チアノーゼ, 意識消失を呈し, 死に至ることもある	注入による場合は, 注入に伴う反応[傷害, 中毒および処置合併症]のgradingを考慮する アナフィラキシーと注入に伴う反応の両方を報告しない
10061664	免疫系障害	Autoimmune disorder	自己免疫障害	症状がない; 臓器機能は正常で, 血清検査などで確認されている自己免疫反応; 治療を要さない	生命維持に必須ではない臓器や機能に対する自己免疫反応(例: 甲状腺機能低下症)	主要臓器の機能に関わる自己免疫反応(例: 大腸炎, 貧血, 心筋炎, 腎炎)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	単一または複数の臓器の機能喪失や組織破壊により生じる障害で, 自身の組織構成要素に対する液性免疫反応または細胞性免疫反応により引き起こされる	このAE termを用いる前に, 具体的な自己免疫のAE termのgradingを考慮する
10052015	免疫系障害	Cytokine release syndrome	サイトカイン放出症候群	全身症状の有無は問わない発熱	輸液に反応する低血圧; 低流量鼻カニューラによる酸素投与を要する低酸素症	昇圧剤単剤で管理できる低血圧; 高流量鼻カニューラやフェイスマスク, 非再呼吸マスク, ペンチュリーマスクによる酸素投与を要する低酸素症	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	サイトカインの放出により引き起こされる, 発熱, 頻呼吸, 頭痛, 頻脈, 低血圧, 皮疹, 低酸素症を特徴とする病態	以下の他の臓器障害のgradingを考慮する 幻覚, 錯乱[精神障害] 不全失語症, 頭痛, 痙攣発作, 振戦[神経系障害]
10018651	免疫系障害	Graft versus host disease	移植片対宿主病	-	内服治療を要する	静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	ドナー細胞の宿主臓器への攻撃により生じる病態	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10021428	免疫系障害	Immune system disorders - Other, specify	免疫系障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	CTCAEにない診断(例: シェーグレン症候群など)の場合に用いる
10081409	免疫系障害	Secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis	二次性血球貪食性リンパ組織球症	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見および/または検査による評価を要する; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する(例: 免疫抑制薬)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	治療に起因する, 発熱, 血球減少, 高フェリチン血症, 凝固障害, 低フィブリノーゲン血症やトランスアミナーゼ上昇を特徴とする病的かつ生化学的な過炎症症候群を呈する病態	-
10040400	免疫系障害	Serum sickness	血清病	臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の関節痛; 発熱, 皮疹, 蕁麻疹; 抗ヒスタミン薬を要する	高度の関節痛または関節炎; 広範な皮疹; 副腎皮質ステロイドや静脈内輸液を要する	生命を脅かす; 陽圧呼吸または人工呼吸を要する	死亡	動物性血清由来の非自己蛋白に対する遅発性過敏反応非自己抗原の投与よりおよそ6-21日後に生じる。症状としては, 発熱, 関節痛, 筋肉痛, 発疹, リンパ節腫脹, 胸部不快感, 呼吸困難が生じる	-
10056519	感染症および寄生虫症	Abdominal infection	腹部感染	-	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	腹腔内の感染	-
10061640	感染症および寄生虫症	Anorectal infection	肛門直腸感染	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	直腸, 肛門部の感染	-
10003011	感染症および寄生虫症	Appendicitis	虫垂炎	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	病原体による虫垂の急性炎症	-
10003012	感染症および寄生虫症	Appendicitis perforated	穿孔性虫垂炎	-	-	内科的治療を要する; 外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	病原体による虫垂の急性炎症で壊疽を伴い虫垂壁の破裂を来した状態。虫垂壁の破裂により虫垂内の炎症性, 細菌性物質が腹腔へ放出される	-
10065744	感染症および寄生虫症	Arteritis infective	感染性動脈炎	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	動脈の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10003458	感染症および寄生虫症	Aseptic meningitis	無菌性髄膜炎	-	-	副腎皮質ステロイドを要する; 精神状態の高度の変化; 自然軽快する痙攣発作; 神経学的異常	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳や脊髄の髄膜の炎症	髄膜炎[感染症および寄生虫症]のgradingを考慮する
10003999	感染症および寄生虫症	Bacteremia	菌血症	-	血液培養陽性で徴候や症状がない	-	-	-	血中に細菌が存在する状態	入院を要するGrade 2を含む敗血症 (Grade 3, 4, 5) [感染症および寄生虫症]のgradingを考慮する
10061695	感染症および寄生虫症	Biliary tract infection	胆道感染	-	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胆道の感染	-
10005047	感染症および寄生虫症	Bladder infection	膀胱感染	-	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膀胱の感染	-
10061017	感染症および寄生虫症	Bone infection	骨感染	-	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	骨の感染	-
10006259	感染症および寄生虫症	Breast infection	乳房感染	-	中等度の症状を伴う局所の感染; 内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 重症の感染; 腋窩リンパ節炎	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	乳房の感染	-
10055078	感染症および寄生虫症	Bronchial infection	気管支感染	-	中等度の症状; 内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	気管支の感染	-
10007152	感染症および寄生虫症	Candidiasis	カンジダ症	症状がない; 局所症状の管理を要する	内服治療を要する(例: 抗真菌薬)	抗真菌薬の静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす	死亡	カンジダによる真菌感染	血液培養が陽性の場合は真菌血症[感染症および寄生虫症]として報告する
10007810	感染症および寄生虫症	Catheter related infection	カテーテル関連感染	-	限局性; 局所的治療を要する; 内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	カテーテルや静脈ポート使用に伴って生じる感染	カテーテルや静脈ポート以外の機器による場合は医療機器関連感染[感染症および寄生虫症]を用いる
10065761	感染症および寄生虫症	Cecal infection	盲腸感染	-	限局性; 内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	盲腸の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10008330	感染症および寄生虫症	Cervicitis infection	感染性子宮頸管炎	-	限局性; 局所的治療を要する (例: 外用の抗菌薬/抗真菌薬/ 抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	子宮頸管の感染	-
10010741	感染症および寄生虫症	Conjunctivitis	結膜炎	症状がない, または軽度の症 状; 治療を要さない	症状があり, 中等度の視力の 低下を伴う(最高矯正視力0.5 以上または既知のベースライ ンから3段階以下の視力低下)	症状があり, 顕著な視力の低 下を伴う(最高矯正視力0.5未 満, 0.1を超える, または既知の ベースラインから3段階を超え る視力低下); 身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への 高度の影響(小児)	罹患眼の最高矯正視力 0.1以下	-	眼結膜に及ぶ炎症, 腫脹, 発 赤	感染が原因の場合, 感染性結 膜炎[感染症および寄生虫 症]のgradingを考慮する
10010742	感染症および寄生虫症	Conjunctivitis infective	感染性結膜炎	-	限局性; 局所的治療を要する (例: 外用の抗菌薬/抗真菌薬/ 抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	-	結膜の感染 臨床的な徴候としては眼が赤 やピンクに変化する	-
10061788	感染症および寄生虫症	Corneal infection	角膜感染	-	限局性; 局所的治療を要する (例: 外用の抗菌薬/抗真菌薬/ 抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	角膜の感染	-
10065765	感染症および寄生虫症	Cranial nerve infection	脳神経感染	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	脳神経の感染	-
10058666	感染症および寄生虫症	Cytomegalovirus infection reactivation	サイトメガロウイルス感 染再燃	症状がない, または軽度の症 状; 臨床所見または検査所見 のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を 要する	重症または医学的に重大であ るが, ただちに生命を脅かすも のではない; 入院または入院 期間の延長を要する; 静脈内 投与による治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する; 失明	死亡	サイトメガロウイルス(CMV)の 再活性化	シノニム: サイトメガロウイルス /CMV
10064687	感染症および寄生虫症	Device related infection	医療機器関連感染	-	内服治療を要する(例: 抗菌薬/ 抗真菌薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	医療機器の使用に伴って生じ る感染	カテーテルや静脈ポートによ る場合はカテーテル関連感染 [感染症および寄生虫症]を用 いる
10065752	感染症および寄生虫症	Duodenal infection	十二指腸感染	-	中等度の症状; 内科的治療を 要する(例: 内服の抗菌薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	十二指腸の感染	-
10014581	感染症および寄生虫症	Encephalitis	脳炎	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 副腎皮質ステロイドを 要する; 精神状態の高度の変 化; 自然軽快する痙攣発作; 神経学的異常	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	脳組織の感染または炎症	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10014619	感染症および寄生虫症	Encephalomyelitis	脳脊髄炎	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 副腎皮質ステロイドを要する; 精神状態の高度の変化; 自然軽快する痙攣発作; 神経学的異常	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳および脊髄組織の感染または炎症	-
10014678	感染症および寄生虫症	Endocarditis infective	感染性心内膜炎	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	心内膜の感染	-
10014801	感染症および寄生虫症	Endophthalmitis	眼内炎	-	局所的治療を要する	全身の治療を要する; 入院を要する	罹患眼の最高矯正視力0.1以下	-	眼内構造物の感染	-
10058838	感染症および寄生虫症	Enterocolitis infectious	感染性小腸結腸炎	-	24時間に>3回の軟便または>48時間の病期期間; 中等度の腹痛; 内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する; 脱水症状を伴う高度の水様便; 血性下痢; 発熱; 高度の腹痛; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	小腸および/または大腸の感染	クロストリディオイデス・ディフィシル (c.diff, c. difficile) 感染症を含む盲腸炎[胃腸障害], 盲腸感染 [感染症および寄生虫症]のgradingを考慮する
10015109	感染症および寄生虫症	Epstein-Barr virus infection reactivation	エプスタイン・バーウイルス感染再燃	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	エプスタイン・バーウイルス (EBV)の再活性化	シノニム: エプスタイン・バーウイルス/EBV
10058804	感染症および寄生虫症	Esophageal infection	食道感染	-	局所的治療を要する (例: 内服の抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	食道の感染	-
10015929	感染症および寄生虫症	Eye infection	眼感染	-	限局性; 局所的治療を要する (例: 外用の抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する; 眼球摘出	死亡	眼の感染	-
10016936	感染症および寄生虫症	Folliculitis	毛包炎	治療を要さない	局所的治療を要する	全身の治療を要する	-	-	毛包の炎症または感染	-
10017544	感染症および寄生虫症	Fungemia	真菌血症	-	中等度の症状; 内科的治療を要する	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する	-	-	血中に真菌が存在する状態	-
10062632	感染症および寄生虫症	Gallbladder infection	胆嚢感染	-	内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胆嚢の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10018784	感染症および寄生虫症	Gum infection	歯肉感染	局所的治療を要する(うがいやすすぎ)	中等度の症状; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	歯肉の感染	-
10056522	感染症および寄生虫症	Hepatic infection	肝感染	-	中等度の症状; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	肝臓の感染	-
10058827	感染症および寄生虫症	Hepatitis B reactivation	B型肝炎再活性化	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する; 重症の非代償性肝硬変(例: 凝固能異常, 脳症, 昏睡)	死亡	B型肝炎ウイルスの再活性化	-
10019799	感染症および寄生虫症	Hepatitis viral	ウイルス性肝炎	症状がなく, 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	症状がある肝障害; 生検で線維化を確認, 代償性肝硬変; 入院または入院期間の延長を要する	生命を脅かす; 重症の非代償性肝硬変(例: 凝固能異常, 脳症, 昏睡)	死亡	肝実質へのウイルスの感染	-
10080137	感染症および寄生虫症	Herpes simplex reactivation	単純ヘルペス再燃	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	単純ヘルペスウイルスの再活性化	-
10021881	感染症および寄生虫症	Infections and infestations - Other, specify	感染症および寄生虫症, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10021918	感染症および寄生虫症	Infective myositis	感染性筋炎	-	限局性; 局所的治療を要する(例: 外用の抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	骨格筋の感染	-
10023216	感染症および寄生虫症	Joint infection	関節の感染	-	限局性; 局所的治療を要する; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗ウイルス薬); 穿刺吸引を要する(単回または複数回)	関節鏡による処置(例: ドレナージ)または関節手術(例: 切開ドレナージ)を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	関節の感染	-
10023424	感染症および寄生虫症	Kidney infection	腎感染	-	内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	腎臓の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10023874	感染症および寄生虫症	Laryngitis	喉頭炎	-	中等度の症状; 内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	喉頭の炎症	治療を要さない症状には、嘔声、咽喉痛[呼吸器、胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する
10065755	感染症および寄生虫症	Lip infection	口唇感染	限局性, 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	-	-	口唇の感染	-
10050823	感染症および寄生虫症	Lymph gland infection	リンパ節感染	-	限局性; 内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	リンパ節の感染	-
10057483	感染症および寄生虫症	Mediastinal infection	縦隔感染	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	縦隔の感染	-
10027199	感染症および寄生虫症	Meningitis	髄膜炎	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 副腎皮質ステロイドを要する; 精神状態の高度の変化; 自然軽快する痙攣発作; 神経学的異常	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳および/または脊髄の髄膜炎の感染または炎症	無菌性髄膜炎[感染症および寄生虫症]のgradingを考慮する
10027282	感染症および寄生虫症	Meningoencephalitis	髄膜脳炎	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 副腎皮質ステロイドを要する; 精神状態の高度の変化; 自然軽快する痙攣発作; 神経学的異常	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	髄膜と脳組織の感染または炎症	-
10065764	感染症および寄生虫症	Mucosal infection	粘膜感染	限局性, 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	粘膜表面の感染	-
10028524	感染症および寄生虫症	Myelitis	脊髄炎	症状がない; 軽度の徴候のみ(例: バビンスキー反射またはレルミッテ徴候)	中等度の脱力または感覚鈍麻; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の脱力または感覚鈍麻; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脊髄の炎症。脱力, 知覚異常, 感覚鈍麻, 著しい不快感, 失禁を伴う	-
10061304	感染症および寄生虫症	Nail infection	爪感染	限局性, 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	-	-	爪の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10033072	感染症および寄生虫症	Otitis externa	外耳炎	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	外耳や耳管の感染。関連因子には水への過度の曝露(スイマーズイヤーズ感染)や耳管の切創が含まれる。症状としては耳閉、そう痒、腫脹、耳部の著しい不快感、耳漏がある	外耳(耳介)への放射線に伴う変化は、放射線性皮膚炎[傷害、中毒および処置合併症]としてgradingする
10033078	感染症および寄生虫症	Otitis media	中耳炎	-	限局性; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	中耳の感染	-
10055005	感染症および寄生虫症	Ovarian infection	卵巣感染	-	限局性; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	卵巣の感染	-
10051741	感染症および寄生虫症	Pancreas infection	膵感染	-	-	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膵臓の感染	-
10034016	感染症および寄生虫症	Paronychia	爪囲炎	爪襞の浮腫や紅斑; 角質の剥脱	局所的治療を要する; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬); 疼痛を伴う爪襞の浮腫や紅斑; 滲出液や爪の分離を伴う; 身の回り以外の日常生活動作の制限;	外科的処置を要する; 抗真菌薬の静脈内投与を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	爪周囲の軟部組織の感染	-
10058674	感染症および寄生虫症	Pelvic infection	骨盤内感染	-	中等度の症状; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	骨盤内の感染	-
10061912	感染症および寄生虫症	Penile infection	陰茎感染	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	陰茎の感染	-
10051472	感染症および寄生虫症	Periorbital infection	眼窩周囲感染	-	限局性; 局所的治療を要する(例: 外用の抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	眼窩の近傍または周囲の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10065766	感染症および寄生虫症	Peripheral nerve infection	末梢神経感染	-	限局性; 局所的治療を要する (例: 外用の抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	末梢神経の感染	-
10057262	感染症および寄生虫症	Peritoneal infection	腹膜感染	-	-	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	腹膜の感染	-
10034835	感染症および寄生虫症	Pharyngitis	咽頭炎	-	内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	咽頭の炎症	Grade 1の場合、咽頭痛[呼吸器、胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する
10056627	感染症および寄生虫症	Phlebitis infective	感染性静脈炎	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	静脈の感染。臨床症状には、紅斑、著しい不快感、腫脹、感染した静脈の走行に沿った硬結がある	-
10061351	感染症および寄生虫症	Pleural infection	胸膜感染	-	内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	胸膜の感染	-
10035664	感染症および寄生虫症	Pneumonia	肺炎	-	中等度の症状; 内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	肺の感染	より一般的に用いられているため肺感染をこの用語に置き換える誤嚥によるもの場合は誤嚥[呼吸器、胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する
10050662	感染症および寄生虫症	Prostate infection	前立腺感染	-	中等度の症状; 内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	前立腺の感染	-
10037888	感染症および寄生虫症	Rash pustular	膿疱性皮疹	-	限局性; 局所的治療を要する (例: 外用の抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	-	-	限局性で盛り上がった、膿で充たされた皮膚病変	膿疱性薬疹[皮膚および皮下組織障害]のgradingを考慮する
10059827	感染症および寄生虫症	Rhinitis infective	感染性鼻炎	-	限局性; 局所的治療を要する	-	-	-	鼻粘膜の感染	-
10039413	感染症および寄生虫症	Salivary gland infection	唾液腺感染	-	中等度の症状; 内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	唾液腺の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10062156	感染症および寄生虫症	Scrotal infection	陰嚢感染	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	陰嚢の感染	-
10040047	感染症および寄生虫症	Sepsis	敗血症	-	-	静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす	死亡	病原性微生物が血流内に存在し、感染に対する宿主の制御不能の反応により種々の程度の臓器障害を生じる	Grade 2の場合、菌血症[感染症および寄生虫症]のgradingを考慮する
10040555	感染症および寄生虫症	Shingles	帯状疱疹	限局性; 局所的治療を要する	中等度の症状を伴う局所の感染; 内服治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 静脈内投与による治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	帯状疱疹ウイルスの再活性化	シノニム: 帯状疱疹/Herpes zoster
10040753	感染症および寄生虫症	Sinusitis	副鼻腔炎	-	限局性; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	副鼻腔粘膜の感染	-
10040872	感染症および寄生虫症	Skin infection	皮膚感染	限局性, 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	蜂巣炎などの皮膚の感染	-
10065771	感染症および寄生虫症	Small intestine infection	小腸感染	-	中等度の症状; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	小腸の感染	-
10062255	感染症および寄生虫症	Soft tissue infection	軟部組織感染	-	限局性; 内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	軟部組織の感染	-
10062112	感染症および寄生虫症	Splenic infection	脾感染	-	-	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脾臓の感染	-
10064505	感染症および寄生虫症	Stoma site infection	ストーマ部感染	限局性, 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗真菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬の静脈内投与による治療を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	ストーマ(体表面に外科的に造設された開口部)の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10048762	感染症および寄生虫症	Tooth infection	歯感染	-	限局性; 局所的治療を要する (例: 外用の抗菌薬/抗真菌薬/ 抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	歯の感染	確定診断/原因特定がされた 場合はそれを記録すること
10044302	感染症および寄生虫症	Tracheitis	気管炎	-	中等度の症状; 内服治療を要 する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗 ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	気管の感染	-
10046300	感染症および寄生虫症	Upper respiratory infection	上気道感染	-	中等度の症状; 内服治療を要 する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗 ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	上気道(鼻, 副鼻腔, 咽頭, 喉 頭, 気管)の感染	-
10052298	感染症および寄生虫症	Urethral infection	尿道感染	-	限局性; 内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイ ルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	尿道の感染	-
10046571	感染症および寄生虫症	Urinary tract infection	尿路感染	-	限局性; 内服治療を要する (例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイ ルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	尿路の感染で, 多くは膀胱と尿 道に生じる	-
10062233	感染症および寄生虫症	Uterine infection	子宮感染	-	中等度の症状; 内服治療を要 する(例: 抗菌薬/抗真菌薬/抗 ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	子宮内膜の感染。子宮筋層や 子宮傍組織へ広がることもあ る	-
10046914	感染症および寄生虫症	Vaginal infection	膣感染	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗菌薬 /抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	膣の感染	-
10054688	感染症および寄生虫症	Viremia	ウイルス血症	-	中等度の症状; 内科的治療を 要する	重症または医学的に重大であ るが, ただちに生命を脅かすも のではない; 入院または入院 期間の延長を要する	-	-	血中にウイルスが存在する状 態	-
10065772	感染症および寄生虫症	Vulval infection	外陰部感染	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗菌薬 /抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	外陰部の感染	-
10048038	感染症および寄生虫症	Wound infection	創傷感染	限局性; 局所的治療を要する	内服治療を要する(例: 抗菌薬 /抗真菌薬/抗ウイルス薬)	抗菌薬/抗真菌薬/抗ウイルス 薬の静脈内投与による治療を 要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	創傷の感染	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10054322	傷害, 中毒および 処置合併症	Anesthetic complication	麻酔合併症	-	症状の改善のための内科的 治療および24時間未満の予 定外の入院を要する麻酔合併 症	症状の改善のための内科的 治療および24時間以上の予 定外の入院を要する麻酔合併 症	生命を脅かす麻酔合併 症; 緊急処置を要する	死亡	処置のための局所的または中 等度の鎮静により生じた合併 症	-
10002899	傷害, 中毒および 処置合併症	Aortic injury	大動脈損傷	-	外科的処置を要さない	高度の症状; 身の回りの日常 生活動作の制限; 修復や再建 を要する; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	生命を脅かす; 重要臓 器障害がある; 緊急の 外科的処置を要する	死亡	大動脈の損傷	-
10003162	傷害, 中毒および 処置合併症	Arterial injury	動脈損傷	症状がない検査所見のみ; 治 療を要さない	症状がある; 修復や再建を要 さない	高度の症状; 身の回りの日常 生活動作の制限; 修復や再建 を要する; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	生命を脅かす; 重要臓 器障害がある; 緊急の 外科的処置を要する	死亡	動脈の損傷	-
10050458	傷害, 中毒および 処置合併症	Biliary anastomotic leak	胆管吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治 療を要さない	症状がある; 内科的治療を要 する	高度の症状; 侵襲的治療を要 する	生命を脅かす; 緊急の 外科的処置を要する	死亡	胆管吻合部(異なる2つの解剖 学的構造の外科的接合)の縫 合不全による胆汁の漏出	-
10065802	傷害, 中毒および 処置合併症	Bladder anastomotic leak	膀胱吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治 療を要さない	症状がある; 内科的治療を要 する	高度の症状; 侵襲的治療を要 する	生命を脅かす; 緊急の 外科的処置を要する	死亡	膀胱吻合部(異なる2つの解剖 学的構造の外科的接合)の縫 合不全による尿の漏出	-
10006504	傷害, 中毒および 処置合併症	Bruising	挫傷	限局性または局所にとどまる	全身性	-	-	-	周囲組織への血液の流出を 伴う軟部組織または骨の損傷	-
10006634	傷害, 中毒および 処置合併症	Burn	熱傷	軽微な症状; 治療を要さない	内科的治療を要する; 最小限 の壊死組織除去を要する	中等度から広範囲の壊死組 織除去または形成術を要する	生命を脅かす	死亡	熱による有害反応で生じる解 剖学的部位の組織統合性の 喪失。化学物質, 直射熱, 電 気, 炎, 放射線により熱傷は生 じ得る。損傷の程度は曝露の 時間と程度と治療開始までの 時間に依存する	-
10061103	傷害, 中毒および 処置合併症	Dermatitis radiation	放射線性皮膚炎	わずかな紅斑や乾性落屑	中等度から高度の紅斑; まだ らな湿性落屑。ただしほとんど が皰や嚢に限局している; 中 等度の浮腫	皰や嚢以外の部位の湿性落 屑; 軽度の外傷や擦過により 出血する	生命を脅かす; 皮膚全 層の壊死や潰瘍; 病変 部より自然に出血する; 皮膚移植を要する	死亡	生物学的な効果を生じるレベ ルに達した電離放射線の曝露 の結果生じる皮膚の炎症反応	シノニム: 放射線に伴う皮膚毒 性(CTCAE v3.0)
10065961	傷害, 中毒および 処置合併症	Esophageal anastomotic leak	食道吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治 療を要さない	症状がある; 内科的治療を要 する	高度の症状; 侵襲的治療を要 する	生命を脅かす; 緊急の 外科的処置を要する	死亡	食道吻合部(異なる2つの解剖 学的構造の外科的接合)の縫 合不全による漏出	-
10016173	傷害, 中毒および 処置合併症	Fall	転倒	軽度で結果として負傷なし; 治 療を要さない	症状がある; 非侵襲的治療を 要する	入院を要する; 侵襲的治療を 要する	-	-	突然の身体の落下, 通常は受 傷する	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065788	傷害, 中毒および 処置合併症	Fallopian tube anastomotic leak	卵管吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	卵管吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065790	傷害, 中毒および 処置合併症	Fallopian tube perforation	卵管穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する (例: 臓器切除)	死亡	卵管壁の穿孔	-
10017076	傷害, 中毒および 処置合併症	Fracture	骨折	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが変位はない; 固定を要する	高度の症状; 変位または開放骨折がある; 身の回りの日常生活動作の制限; 外科的処置を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	骨の連続性が失われた状態	-
10065893	傷害, 中毒および 処置合併症	Gastric anastomotic leak	胃吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065879	傷害, 中毒および 処置合併症	Gastrointestinal anastomotic leak	胃腸吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	胃腸吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065712	傷害, 中毒および 処置合併症	Gastrointestinal stoma necrosis	消化管ストーマ壊死	-	表層的な壊死; 治療を要さない	高度の症状; 入院を要する; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	消化管ストーマに生じる壊死	-
10051792	傷害, 中毒および 処置合併症	Infusion related reaction	注入に伴う反応	軽度で一過性の反応; 点滴の中断を要さない; 治療を要さない	治療または点滴の中断が必要。ただし症状に対する治療(例: 抗ヒスタミン薬, NSAIDs, 麻薬性薬剤, 静脈内輸液)には速やかに反応する; <=24時間の予防的投薬を要する	遅延(例: 症状に対する治療および/または短時間の点滴中止に対して速やかに反応しない); 一度改善しても再発する; 続発症により入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	薬物または生物製剤の輸注に対する有害反応	薬剤に対するアレルギー反応の場合はアレルギー反応(免疫系障害)として報告する 注入に伴う反応とアレルギー反応の両方を報告しない
10022161	傷害, 中毒および 処置合併症	Injury to carotid artery	頰動脈損傷	-	修復や再建を要さない	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限(例: 一過性脳虚血); 修復や再建を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	頰動脈の損傷	-
10022213	傷害, 中毒および 処置合併症	Injury to inferior vena cava	下大静脈損傷	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 修復や再建を要さない	高度の症状; 修復や再建を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	下大静脈の損傷	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065849	傷害, 中毒および 処置合併症	Injury to jugular vein	頸静脈損傷	-	修復や再建を要さない	症状がある; 修復や再建を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	頸静脈の損傷	-
10022356	傷害, 中毒および 処置合併症	Injury to superior vena cava	上大静脈損傷	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 修復や再建を要さない	症状がある; 修復や再建を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	上大静脈の損傷	-
10022117	傷害, 中毒および 処置合併症	Injury, poisoning and procedural complications - Other, specify	傷害, 中毒および処置合併症, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10059095	傷害, 中毒および 処置合併症	Intestinal stoma leak	腸管ストーマ部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	腸管ストーマ(体表面に外科的に造設された開口部)からの内容物の漏出	-
10059094	傷害, 中毒および 処置合併症	Intestinal stoma obstruction	腸管ストーマ閉塞	-	自然軽快する; 治療を要さない	高度の症状; 静脈内輸液/経管栄養/>=24時間のTPNを要する; 待機的な外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	腸管ストーマ内容物の正常な流出の途絶	-
10049468	傷害, 中毒および 処置合併症	Intestinal stoma site bleeding	腸管ストーマ部出血	臨床所見でみられる軽微な出血; 治療を要さない	中等度の出血; 内科的治療を要する	侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	腸管ストーマからの出血	-
10065826	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative arterial injury	術中動脈損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の動脈損傷	-
10065831	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative breast injury	術中乳房損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の乳房実質の損傷	-
10065843	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative cardiac injury	術中心臓損傷	-	-	損傷臓器/構造の修復を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の心臓の損傷	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065844	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative ear injury	術中耳部損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限(例: 聴力低下; 平衡覚の障害); 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の耳部の損傷	-
10065834	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative endocrine injury	術中内分泌系損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の内分泌器官の損傷	-
10065825	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative gastrointestinal injury	術中消化管損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の消化管系の損傷	-
10065842	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative head and neck injury	術中頭頸部損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の頭頸部の損傷	-
10055298	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative hemorrhage	術中出血	-	-	術後の侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中のコントロールできない出血	-
10065827	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative hepatobiliary injury	術中肝胆道系損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の肝実質および/または胆道の損傷	-
10065829	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative musculoskeletal injury	術中筋骨格系損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の筋骨格系の損傷	-
10065830	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative neurological injury	術中神経系損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の神経系の損傷	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065841	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative ocular injury	術中眼損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の眼の損傷	-
10065845	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative renal injury	術中腎損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の腎臓の損傷	-
10065840	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative reproductive tract injury	術中生殖器系損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の生殖器系の損傷	-
10065832	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative respiratory injury	術中呼吸器系損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の呼吸器系の損傷	-
10065847	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative splenic injury	術中脾臓損傷	-	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の脾臓の損傷	-
10065828	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative urinary injury	術中尿路損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の尿路系の損傷	-
10065848	傷害, 中毒および 処置合併症	Intraoperative venous injury	術中静脈損傷	損傷臓器/構造の修復を要するが切除を要さない	損傷臓器/構造の部分切除を要する	損傷臓器/構造の完全切除または再建術を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術中の静脈の損傷	-
10065803	傷害, 中毒および 処置合併症	Kidney anastomotic leak	腎吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	腎吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による尿の漏出	-
10065891	傷害, 中毒および 処置合併症	Large intestinal anastomotic leak	大腸吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	大腸吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10052897	傷害, 中毒および処置合併症	Nerve injury	神経損傷	-	身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	侵襲的治療を要する; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	神経の損傷	-
10050457	傷害, 中毒および処置合併症	Pancreatic anastomotic leak	膵吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	膵吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065705	傷害, 中毒および処置合併症	Pharyngeal anastomotic leak	咽頭吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	咽頭吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10054113	傷害, 中毒および処置合併症	Post biopsy bleeding	生検後出血	-	追加の経過観察を要する	輸血を要する; 侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	生検の結果生じた出血	-
10055322	傷害, 中毒および処置合併症	Postoperative hemorrhage	術後出血	軽度の症状; 治療を要さない	< 2単位(小児では10 cc/kg)のpRBC輸血を要する中等度の出血	>=2単位(小児では10 cc/kg)のpRBC輸血を要する; 侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	手術後に生じる出血	生検後出血(傷害, 中毒および処置合併症)のgradingを考慮する
10056745	傷害, 中毒および処置合併症	Postoperative thoracic procedure complication	術後胸部処置合併症	-	抜管までに術後24-72時間かかる	抜管までが術後72時間を超えるが気管切開を要さない	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例: 気管切開や気管内挿管)	死亡	胸部手術後に新たに生じた合併症	-
10065745	傷害, 中毒および処置合併症	Prolapse of intestinal stoma	腸管ストーマ脱出	症状がない; 整復可能	用手整復後の再発; 局所の刺激感や排便漏出; ストーマ用具がフィットしにくい; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 待機的な外科的処置を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	腸管ストーマ(体表面に外科的に造設された開口部)の腹壁表面からの突出	-
10065822	傷害, 中毒および処置合併症	Prolapse of urostomy	ウロストミー一部脱出	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	局所ケアまたは管理; 小規模な再建を要する	ストーマの機能不全; 待機的外科的処置またはストーマの大きかりな(major)再建を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	ウロストミーの変位	-
10037767	傷害, 中毒および処置合併症	Radiation recall reaction (dermatologic)	放射線照射リコール反応(皮膚科的)	わずかな紅斑や乾性落屑	中等度から高度の紅斑; まだらな湿性落屑。ただしほとんどが皴や皰に局限している; 中等度の浮腫	皴や皰以外の部位の湿性落屑; 軽度の外傷や擦過により出血する	生命を脅かす; 皮膚全層の壊死や潰瘍; 病変部より自然に出血する; 皮膚移植を要する	死亡	放射線照射後数週/数か月後に、薬物、特に抗がん薬投与により生じる急性皮膚炎症反応。炎症反応は照射部位に限定され、薬物中止後は症状が消失する	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065894	傷害, 中毒および 処置合併症	Rectal anastomotic leak	直腸吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	直腸吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10040102	傷害, 中毒および 処置合併症	Seroma	漿液腫	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 吸引を要する	症状があり, 待機的侵襲的治療を要する	-	-	組織内に漿液が腫瘤状に貯留したもの	-
10065892	傷害, 中毒および 処置合併症	Small intestinal anastomotic leak	小腸吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	小腸吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065897	傷害, 中毒および 処置合併症	Spermatic cord anastomotic leak	精索吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	精索吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065898	傷害, 中毒および 処置合併症	Stenosis of gastrointestinal stoma	消化管ストーマ狭窄	-	症状がある; <24時間の静脈内輸液を要する; ベッドサイドでの用手的拡張を要する	消化管機能の高度の変化; 経管栄養/TPN/入院を要する; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	消化管ストーマ(体表面に外科的に造設された開口部)の狭窄	-
10042127	傷害, 中毒および 処置合併症	Stomal ulcer	吻合部潰瘍	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 待機的外科的処置を要する	-	-	胃腸吻合術後に生じる吻合部近傍の粘膜面の限局性のびらん性病変	-
10089920	傷害, 中毒および 処置合併症	Systemic post- immunization reaction	予防接種後全身反応	軽度の疼痛; 2.5 - 5 cmの紅斑; 2.5 - 5 cmの硬結/腫脹; 日常生活動作の制限なし	中等度の疼痛; >5 - 10 cmの紅斑; >5 - 10 cmの硬結/腫脹; 脂肪萎縮症; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; >10 cmの紅斑; >10 cmの硬結/腫脹; 壊死; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	-	抗原性を有する物質の注射後に, 免疫系の活性化に伴って生じる全身的な臨床症状	-
10080903	傷害, 中毒および 処置合併症	Tissue injury	組織損傷	-	身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	侵襲的治療を要する; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	処置の結果として生じた臓器や組織の損傷	-
10062548	傷害, 中毒および 処置合併症	Tracheal hemorrhage	気管出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	気管からの出血	-
10044291	傷害, 中毒および 処置合併症	Tracheal obstruction	気管閉塞	症状がなく, 検査(例: 視診/画像/内視鏡)により確認される部分的な閉塞	症状があるが(例: 呼吸時の気道雑音), 呼吸障害を伴わない; 内科的治療を要する(例: 副腎皮質ステロイド); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	喘鳴または呼吸障害; 侵襲的治療を要する(例: スtent, レーザー); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例: 気管切開や気管内挿管)	死亡	気管内腔の途絶	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10065749	傷害, 中毒および処置合併症	Tracheostomy site bleeding	気管切開部位出血	臨床所見で見られる軽微な出血; 治療を要さない	中等度の出血; 内科的治療を要する	侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	気管切開部からの出血	-
10065814	傷害, 中毒および処置合併症	Ureteric anastomotic leak	尿管吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	尿管吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065815	傷害, 中毒および処置合併症	Urethral anastomotic leak	尿道吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	尿道吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065882	傷害, 中毒および処置合併症	Urostomy leak	ウロストミー一部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	ウロストミーからの内容物の漏出	-
10065883	傷害, 中毒および処置合併症	Urostomy obstruction	ウロストミー一部閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 拡張術/内視鏡的修復/ステント留置を要する	臓器機能の高度の変化(例: 敗血症, 水腎症, 腎機能低下); 待機的な外科的処置を要する	生命を脅かす; 臓器不全; 緊急の外科的処置を要する	死亡	ウロストミーの途絶	-
10065748	傷害, 中毒および処置合併症	Urostomy site bleeding	ウロストミー一部出血	臨床所見で見られる軽微な出血; 治療を要さない	中等度の出血; 内科的治療を要する	侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	ウロストミーからの出血	-
10065885	傷害, 中毒および処置合併症	Urostomy stenosis	ウロストミー一部狭窄	-	症状があるが水腎症, 敗血症, 腎機能低下を伴わない; 拡張術/内視鏡的修復/ステント留置を要する	症状がある(例: 水腎症, 腎機能低下); 待機的な外科的処置を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	ウロストミーの狭窄	-
10065886	傷害, 中毒および処置合併症	Uterine anastomotic leak	子宮吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	子宮吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10046810	傷害, 中毒および処置合併症	Uterine perforation	子宮穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	子宮壁の穿孔	-
10065887	傷害, 中毒および処置合併症	Vaginal anastomotic leak	膣吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	膣吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10065888	傷害, 中毒および処置合併症	Vas deferens anastomotic leak	精管吻合部漏出	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	精管吻合部(異なる2つの解剖学的構造の外科的接合)の縫合不全による漏出	-
10062169	傷害, 中毒および処置合併症	Vascular access complication	血管確保合併症	全身の治療を意図しないTPAのライン内投与を要する	機器のずれ, 閉塞, 漏出, 位置の異常; 機器の交換を要する	肺塞栓症/深部静脈血栓/心内血栓; 治療を要する	循環動態が不安定または神経学的に不安定で生命を脅かす	死亡	血管確保部位に関連して新たに生じた合併症	-
10047228	傷害, 中毒および処置合併症	Venous injury	静脈損傷	症状がない検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある(例: 跛行); 修復や再建を要さない	高度の症状; 修復や再建を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 重要臓器障害がある; 緊急の外科的処置を要する	死亡	静脈の損傷	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10053692	傷害, 中毒および処置合併症	Wound complication	創合併症	経過観察のみ; 局所的治療を要する	ベッドサイドでの局所的治療を要する	外科的処置を要する	生命を脅かす	死亡	既存の創傷に新たに生じた合併症	このAE termを用いる前に, 創離開[傷害, 中毒および処置合併症]または創傷感染[感染症および寄生虫症]のgradingを考慮する
10048031	傷害, 中毒および処置合併症	Wound dehiscence	創離開	創離開; 治療を要さない	創離開があり, 局所的治療(例: 縫合)または内科的治療(例: 鎮痛薬)を要する	内臓露出を伴わない筋膜離開/裂開; 外科的処置による再建を要する	生命を脅かす; 絞扼の所見があり, 症状を伴うヘルニア; 内臓露出を伴う筋膜離開; 皮弁による大規模な再建, 移植, 切除, 切断術を要する	死亡	外科縫合創の離開	創傷感染[感染症および寄生虫症]のgradingを考慮する
10000636	臨床検査	Activated partial thromboplastin time prolonged	活性化部分トロンボプラスチン時間延長	>ULN - 1.5 × ULN	> 1.5-2.5 × ULN	> 2.5 × ULN; 出血	-	-	部分トロンボプラスチン時間が正常値を超える臨床検査値の異常。部分トロンボプラスチン時間の延長は凝固能異常の指標であり, 原疾患と治療の両者を含む様々な疾患や障害により引き起こされる	-
10001551	臨床検査	Alanine aminotransferase increased	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >ULN - 3.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 1.0 - 1.5 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 > 3.0 - 5.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 > 1.5 - 2.0 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 > 5.0 - 20.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 > 2.0 - 4.0 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 > 20.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 > 4.0 × ベースライン	-	臨床検査にて血中アラニンアミノトランスフェラーゼ (ALTまたはsGPT) レベルが上昇	肝不全[肝胆道系障害]のgradingを考慮する 自己免疫性肝炎は肝胆道系障害, その他(具体的に記載)として報告する
10001675	臨床検査	Alkaline phosphatase increased	アルカリホスファターゼ増加	>ベースラインかつ >ULN	-	-	-	-	臨床検査にて血中アルカリホスファターゼ (ALP) レベルが上昇	-
10003481	臨床検査	Aspartate aminotransferase increased	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >ULN - 3.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 1.0 - 1.5 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 > 3.0 - 5.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 > 1.5 - 2.0 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 > 5.0 - 20.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 > 2.0 - 4.0 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 > 20.0 × ULN; ベースラインが >ULN の場合 > 4.0 × ベースライン	-	臨床検査にて血中アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (ASTまたはsGOT) レベルが上昇	肝不全[肝胆道系障害]のgradingを考慮する 自己免疫性肝炎は肝胆道系障害, その他(具体的に記載)として報告する
10005332	臨床検査	Blood antidiuretic hormone abnormal	血中抗利尿ホルモン検査異常	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	入院を要する	-	-	臨床検査にて血中抗利尿ホルモン (ADH) レベルが異常	-
10005359	臨床検査	Blood bicarbonate decreased	血中重炭酸塩減少	<LLNで治療を要さない	-	-	-	-	臨床検査にて静脈血中重炭酸塩レベルが減少	アシドーシスとアルカローシス[代謝および栄養障害]のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10005364	臨床検査	Blood bilirubin increased	血中ビリルビン増加	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >ULN - 1.5 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 >1.0 - 1.5 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >1.5 - 3.0 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 >1.5 - 2.5 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >3.0 - 10.0 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 >2.5 - 10.0 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >10.0 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 >10.0 × ベースライン	-	臨床検査にて血中総ビリルビンレベルが上昇。ビリルビン過剰は黄疸と関連	肝不全[肝胆道系障害]のgradingを考慮する 自己免疫性肝炎は肝胆道系障害, その他(具体的に記載)として報告する
10005452	臨床検査	Blood corticotrophin decreased	血中コルチコトロピン減少	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	入院を要する	-	-	臨床検査にて血中コルチコトロピン(ACTH)が予期されるレベルより低下	-
10005561	臨床検査	Blood gonadotrophin abnormal	血中ゴナドトロピン異常	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する	-	-	-	臨床検査にて血中ゴナドトロピンレベルが異常	-
10005630	臨床検査	Blood lactate dehydrogenase increased	血中乳酸脱水素酵素増加	>ULN	-	-	-	-	臨床検査にて血中乳酸脱水素酵素(LDH)レベルが上昇	-
10005778	臨床検査	Blood prolactin abnormal	血中プロラクチン異常	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	-	-	-	臨床検査にて血中プロラクチンレベルが異常	-
10065906	臨床検査	Carbon monoxide diffusing capacity decreased	一酸化炭素拡散能減少	ベースラインがない場合LLNから3-5 units下回る; フォローアップでベースラインと比べ3-5 units (mL/min/mmHg)低下; 症状がなく治療を要さない	ベースラインがない場合LLNから>5-8 units下回る; フォローアップで症状がなくベースラインと比べ>5-8 units (mL/min/mmHg)低下; 症状があるが治療を要さない	症状がなく>8 unitsの低下; 肺の症状があり>5 unitsの低下(例: >Grade 2の低酸素症, >Grade 2の呼吸困難); 治療を要する	-	-	肺機能検査にて一酸化炭素拡散能(DLCOまたはTLCO)が減少	呼吸不全, 呼吸困難[呼吸器, 胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する
10007839	臨床検査	CD4 lymphocytes decreased	CD4リンパ球減少	<LLN - 500/mm ³ ; <LLN - 0.5 × 10 ⁹ /L	<500-200/mm ³ ; <0.5 - 0.2 × 10 ⁹ /L	<200 - 50/mm ³ ; <0.2 - 0.05 × 10 ⁹ /L	<50/mm ³ ; <0.05 × 10 ⁹ /L	-	臨床検査にて血中CD4リンパ球数レベルが低下	-
10008661	臨床検査	Cholesterol high	コレステロール高値	>ULN - 300 mg/dL; >ULN - 7.75 mmol/L	>300 - 400 mg/dL; >7.75 - 10.34 mmol/L	>400 - 500 mg/dL; >10.34 - 12.92 mmol/L	>500 mg/dL; >12.92 mmol/L	-	臨床検査にて血中コレステロールレベルが正常上限を超える	-
10011363	臨床検査	Creatinine clearance decreased	クレアチニン・クリアランス減少	-	26 - 49 mL/min	10 - 25 mL/min	-	-	24時間蓄尿でのクレアチニンクリアランス(crCl)低下	Grade 4-5の場合, 急性腎障害または慢性腎臓病[腎および尿路障害]を報告する
10011368	臨床検査	Creatinine increased	クレアチニン増加	>ULN - 1.5 × ULN	ベースラインが基準範囲下限未満の場合>1.5 - 3.0 × ベースライン; >1.5 - 3.0 × ULN	ベースラインが基準範囲下限未満の場合>3.0 × ベースライン; >3.0 - 6.0 × ULN	>6.0 × ULN	-	臨床検査にて生体試料のクレアチニンレベルが上昇	急性腎障害, 糸球体腎炎, 尿管間質性腎炎[腎および尿路障害]のgradingを考慮する
10014383	臨床検査	Electrocardiogram QT corrected interval prolonged	心電図QT補正間隔延長	平均QTc 450 - 480 ms	平均QTc 481 - 500 ms	平均QTc>500 ms; ベースラインから>60 msの変化	生命を脅かす; Torsade de pointes; 多型性心室頻拍	-	QT補正間隔延長を特徴とする心臓のリズム障害	心室性不整脈, 心室細動, 心室性頻脈[心臓障害]のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10016596	臨床検査	Fibrinogen decreased	フィブリノゲン減少	<1.0 - 0.75 × LLN; ベースラインが異常値の場合 ベースラインから<25%の減少	<0.75 - 0.5 × LLN; ベースラインが異常値の場合 ベースラインから25 - <50%の減少	<0.5 - 0.25 × LLN; ベースラインが異常値の場合 ベースラインから50 - <75%の減少	<0.25 × LLN; ベースラインが異常値の場合 ベースラインから75%以上の減少; 絶対値が<50 mg/dL	-	臨床検査にて血中フィブリノゲンレベルが低下	-
10016987	臨床検査	Forced expiratory volume decreased	努力呼気量減少	%FEV1 99 - 70% (FEV1とFVC測定値のパーセンテージはそれぞれの予測値に基づく); グローバル肺機能イニシアチブ (GLI) Zスコア -1.65 ~ -2.5	%FEV1 60 - <70%; GLI Zスコア <-2.5 ~ -4	%FEV1 >49 - <60%; GLI Zスコア <-4	-	-	ある単位時間(秒)あたりの呼気量である努力性肺活量が相対的に低下	呼吸不全, 呼吸困難[呼吸器, 胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する
10056910	臨床検査	GGT increased	GGT増加	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 > ULN - 2.5 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 1.0 - 1.5 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >2.5 - 5.0 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 1.5 - 3.0 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >5.0 - 20.0 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 >3.0 - 10.0 × ベースライン	ベースラインが基準範囲上限以下の場合 >20.0 × ULN; ベースラインが>ULNの場合 >10.0 × ベースライン	-	臨床検査にて血中γ-グルタミルトランスフェラーゼレベルが上昇。GGT(γ-グルタミルトランスフェラーゼ)はγ-グルタミンペプチドを他のペプチドやアミノ酸, 水に変換するγ-グルタミルグループに対する酵素	-
10018748	臨床検査	Growth hormone abnormal	成長ホルモン異常	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	-	-	-	臨床検査にて生体試料の成長ホルモン(GH)レベルが異常	-
10019150	臨床検査	Haptoglobin decreased	ハプトグロビン減少	<LLN	-	-	-	-	臨床検査にて血中ハプトグロビン(HP)レベルが低下	-
10019186	臨床検査	HDL decreased	HDL減少	<LLN	-	-	-	-	臨床検査にて血中HDLが低下	-
10055599	臨床検査	Hemoglobin increased	ヘモグロビン増加	ULNより0 - 2 g/dL増加	ULNより>2 - 4 g/dL増加	ULNより>4 g/dL増加	-	-	臨床検査にて血中ヘモグロビン(Hgb)レベルが基準範囲より上昇	-
10022402	臨床検査	INR increased	INR増加	>1.2 - 1.5; 抗凝固療法を行っている場合 ベースラインの>1 - 1.5倍; モニタリングのみを要する	>1.5 - 2.5; 抗凝固療法を行っている場合 ベースラインの>1.5 - 2.5倍; 用量調節を要する	>2.5; 抗凝固療法を行っている場合 ベースラインの>2.5倍; 出血	-	-	臨床検査にて患者の血中プロトロンビン時間(PT)の対照検体に対する比が増加	-
10022891	臨床検査	Investigations - Other, specify	臨床検査, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10024057	臨床検査	LDL increased	LDL増加	> ULN	-	-	-	-	臨床検査にて血中LDLが増加	-
10024574	臨床検査	Lipase increased	リパーゼ増加	> ULN - 1.5 × ULN	> 1.5 - 3.0 × ULN; 3.0 - 5.0 × ULNで症状がない	> 3.0 - 5.0 × ULNで徴候や症状がある; > 5.0 × ULNで症状がない	> 5.0 × ULNで徴候や症状がある	-	臨床検査にて生体試料のリパーゼレベルが上昇	肺炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10025258	臨床検査	Lymphocyte count increased	リンパ球数増加	-	> 4,000 - 20,000/mm ³	> 20,000/mm ³	-	-	臨床検査にて血中/体液中/骨髄中のリンパ球数が増加	-
10029366	臨床検査	Neutrophil count decreased	好中球数減少	< 1,500 - 1,000/mm ³ ; < 1.5 - 1.0 × 10 ⁹ /L	< 1,000 - 500/mm ³ ; < 1.0 - 0.5 × 10 ⁹ /L	< 500 - 100/mm ³ ; < 0.5 - 0.1 × 10 ⁹ /L	< 100/mm ³ ; < 0.1 × 10 ⁹ /L	-	臨床検査にて血中好中球数(ANC)が減少	-
10029368	臨床検査	Neutrophil count increased	好中球数増加	あり	-	-	-	-	臨床検査にて血中好中球数(ANC)が増加	-
10040139	臨床検査	Serum amylase increased	血清アミラーゼ増加	> ULN-1.5 × ULN	> 1.5 - 2.0 × ULN; 2.0 - 5.0 × ULNで症状がないか軽度の徴候や症状がある	> 2.0 - 5.0 × ULNで中等度か高度の徴候や症状がある; > 5.0×ULNで症状がない	> 5.0 × ULNで徴候や症状がある	-	臨床検査にて血清アミラーゼレベルが上昇	肺炎[胃腸障害]のgradingを考慮する
10043770	臨床検査	Thyroid stimulating hormone increased	甲状腺刺激ホルモン増加	TSH増加があるが治療を要さない	-	-	-	-	甲状腺刺激ホルモン(TSH)が増加	治療を要する場合、または症状がある場合、甲状腺機能低下症[内分泌障害]として報告する
10046553	臨床検査	Urinary protein increased	尿蛋白増加	成人: 蛋白尿1+; 尿蛋白>=ULN -<1.0 g/24時間; P/C < 1; 小児: 蛋白尿1+ *P/C: 尿タンパク/クレアチニン比	成人: 蛋白尿2+ - 3+; 尿蛋白1.0 - < 3.5 g/24時間; P/C 1 - 3.5; 小児: P/C 0.5 - 1.9; 蛋白尿2+ - 3+	成人: 尿蛋白>= 3.5 g/24時間; 蛋白尿4+ P/C > 3.5 小児: P/C > 1.9; 蛋白尿4+	-	-	臨床検査にて尿中に過剰な蛋白がある。ほとんどがアルブミンだがグロブリンもある	尿試験紙検査より24時間蓄尿が優先される
10059895	臨床検査	Urine output decreased	尿量減少	-	-	成人: 乏尿(8時間で<80 mL); 幼児: < 1 mL/kg/時 小児: < 0.5 mL/kg/時	成人: 無尿(24時間で<240 mL); 小児: 12時間にわたって尿排出がない	-	尿量が以前に比べ減少	-
10047580	臨床検査	Vital capacity abnormal	肺活量異常	予測値の90-75%	予測値の<75 - 50%; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	予測値の<50%;身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	肺機能検査で予測値と比べた肺活量(VC)(最大吸気後の呼気量)の異常	努力呼気量減少[臨床検査],呼吸困難,呼吸不全[呼吸器,胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10062189	臨床検査	Vitamin D decreased	ビタミンD減少	ビタミンD < LLN	-	-	-	-	臨床検査にて血中ビタミンD濃度が減少	-
10047896	臨床検査	Weight gain	体重増加	ベースラインより5 - <10%増加	ベースラインより10 - <20%増加	ベースラインより>=20%増加	-	-	予期されない/異常な体重の増加。小児ではベースライン成長曲線から予期される絶対値より大きい(パーセンタイルの変化ではない)	-
10047900	臨床検査	Weight loss	体重減少	ベースラインより5 - <10%減少; 治療を要さない	ベースラインより10 - <20%減少; 栄養補給を要する	ベースラインより>=20%減少; 経管栄養またはTPNを要する	-	-	体重の減少。小児ではベースライン成長曲線より小さい	-
10049182	臨床検査	White blood cell decreased	白血球減少	< LLN - 3,000/mm ³ ; < LLN - 3.0 × 10 ⁹ /L	< 3,000 - 2,000/mm ³ ; < 3.0 - 2.0 × 10 ⁹ /L	< 2,000 - 1,000/mm ³ ; < 2.0 - 1.0 × 10 ⁹ /L	< 1,000/mm ³ ; < 1.0 × 10 ⁹ /L	-	臨床検査で血中白血球(WBC)が減少	-
10000486	代謝および栄養障害	Acidosis	アシドーシス	pH < 正常値, ただし>=7.3	-	pH < 7.3	生命を脅かす	死亡	血中や他の組織中の酸(高水素イオン濃度)の過剰	-
10001598	代謝および栄養障害	Alcohol intolerance	アルコール不耐性	-	あり	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	鼻詰まり, 皮膚の紅潮, 不整脈, 悪心, 嘔吐, 消化不良, 頭痛など, アルコールによる有害事象が起こりやすい状態	-
10001680	代謝および栄養障害	Alkalosis	アルカローシス	pH > 正常値, ただし<=7.5	-	pH > 7.5	生命を脅かす	死亡	血中や他の組織中のアルカリイオン(低水素イオン濃度)の過剰	-
10002646	代謝および栄養障害	Anorexia	食欲不振	摂食習慣の変化を伴わない食欲低下	顕著な体重減少や栄養失調を伴わない摂食量の変化; 経口栄養剤による補充を要する	顕著な体重減少または栄養失調を伴う(例: カロリーや水分の経口摂取が不十分); 静脈内輸液/経管栄養/TPNを要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	食欲の低下	-
10012174	代謝および栄養障害	Dehydration	脱水	経口水分補給の増加を要する; 粘膜の乾燥; 皮膚ソルゴルの低下	静脈内輸液を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	体から過度に水分が失われた状態。通常, 高度の下痢, 嘔吐, 発汗により起こる	-
10012601	代謝および栄養障害	Diabetes mellitus	糖尿病	ベースラインを超える血糖値異常; 食事の変更のみ; ベースラインでの血糖コントロールから変更なし	経口血糖降下薬を要する; インスリンのスライディングスケール管理の開始を要する	インスリン治療の開始または強化を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する; 糖尿病性ケトアシドーシス	死亡	臓器障害につながり得るHbA1cの増加に特徴づけられる病態	高血糖[代謝および栄養障害]のgradingを考慮する
10016165	代謝および栄養障害	Failure to thrive	発育不全	-	身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	体重減少, 食欲低下, 摂食減少, 活動性の低下を伴う全身状態の低下	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10020587	代謝および栄養障害	Hypercalcemia	高カルシウム血症	補正血清カルシウム > ULN - 11.5 mg/dL; > ULN - 2.9 mmol/L; イオン化カルシウム > ULN - 1.5 mmol/L	補正血清カルシウム > 11.5 - 12.5 mg/dL; > 2.9 - 3.1 mmol/L; イオン化カルシウム > 1.5 - 1.6 mmol/L; 症状がある	補正血清カルシウム > 12.5 - 13.5 mg/dL; > 3.1 - 3.4 mmol/L; イオン化カルシウム > 1.6 - 1.8 mmol/L; 入院を要する	補正血清カルシウム > 13.5 mg/dL; > 3.4 mmol/L; イオン化カルシウム > 1.8 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中カルシウム濃度(アルブミン補正)が増加	-
10020639	代謝および栄養障害	Hyperglycemia	高血糖	空腹時血糖値 > ULN - 160 mg/dL; 空腹時血糖値 > ULN - 8.9 mmol/L	空腹時血糖値 > 160 - 250 mg/dL; 空腹時血糖値 > 8.9 - 13.9 mmol/L	空腹時血糖値 > 250 - 500 mg/dL; 空腹時血糖値 > 13.9 - 27.8 mmol/L; 入院を要する	空腹時血糖値 > 500 mg/dL; 空腹時血糖値 > 27.8 mmol/L; 生命を脅かす	-	臨床検査にて短時間かつ予期されない血糖値の上昇(glycemia)が確認された状態	糖尿病(代謝および栄養障害)のgradingを考慮する
10020647	代謝および栄養障害	Hyperkalemia	高カリウム血症	> ULN - 5.5 mmol/L	> 5.5 - 6.0 mmol/L; 治療を要する	> 6.0 - 7.0 mmol/L; 入院を要する	> 7.0 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中カリウム濃度が上昇。腎障害や、時に利尿薬の使用に関連する	-
10020667	代謝および栄養障害	Hyperlipidemia	高脂血症	食事の変更を要する	薬物療法を要する	入院を要する	生命を脅かす	-	臨床検査にて血中脂質濃度が上昇	肺炎(胃腸障害)のgradingを考慮する
10020670	代謝および栄養障害	Hypermagnesemia	高マグネシウム血症	> ULN - 3.0 mg/dL; > ULN - 1.23 mmol/L	-	> 3.0 - 8.0 mg/dL; > 1.23 - 3.30 mmol/L	> 8.0 mg/dL; > 3.30 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中マグネシウム濃度が上昇	-
10020680	代謝および栄養障害	Hypernatremia	高ナトリウム血症	> ULN - 150 mmol/L	> 150 - 155 mmol/L; 治療を要する	> 155 - 160 mmol/L; 入院を要する	> 160 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中ナトリウム濃度が上昇	-
10020712	代謝および栄養障害	Hyperphosphatemia	高リン血症	検査値異常のみで治療を要さない	非侵襲的治療を要する	重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する(例: 透析)	死亡	臨床検査にて血中リン酸塩濃度が上昇	-
10020870	代謝および栄養障害	Hypertriglyceridemia	高トリグリセリド血症	150 - 300 mg/dL; 1.71 - 3.42 mmol/L	> 300 - 500 mg/dL; > 3.42 - 5.7 mmol/L	> 500 - 1,000 mg/dL; > 5.7 - 11.4 mmol/L	> 1,000 mg/dL; > 11.4 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中トリグリセリド濃度が上昇	-
10020907	代謝および栄養障害	Hyperuricemia	高尿酸血症	> ULNであるが生理機能に影響がない	-	> ULNであり、生理機能に影響がある	生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中尿酸濃度が上昇	-
10020943	代謝および栄養障害	Hypoalbuminemia	低アルブミン血症	< LLN - 3 g/dL; < LLN - 30 g/L	< 3 - 2 g/dL; < 30 - 20 g/L	< 2 g/dL; < 20 g/L	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	臨床検査にて血中アルブミン濃度が低下	-
10020949	代謝および栄養障害	Hypocalcemia	低カルシウム血症	補正血清カルシウム < LLN - 8.0 mg/dL; < LLN - 2.0 mmol/L; イオン化カルシウム < LLN - 1.0 mmol/L	補正血清カルシウム < 8.0 - 7.0 mg/dL; < 2.0 - 1.75 mmol/L; イオン化カルシウム < 1.0 - 0.9 mmol/L; 症状がある	補正血清カルシウム < 7.0 - 6.0 mg/dL; < 1.75 - 1.5 mmol/L; イオン化カルシウム < 0.9 - 0.8 mmol/L; 入院を要する	補正血清カルシウム < 6.0 mg/dL; < 1.5 mmol/L; イオン化カルシウム < 0.8 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中カルシウム濃度(アルブミン補正)が低下	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10021005	代謝および栄養 障害	Hypoglycemia	低血糖	<LLN - 55 mg/dL; <LLN - 3.0 mmol/L	<55 - 40 mg/dL; <3.0 - 2.2 mmol/L	<40 - 30 mg/dL; <2.2 - 1.7 mmol/L	<30 mg/dL; <1.7 mmol/L; 生命を脅かす; 痙攣発作	死亡	臨床検査にて血中ブドウ糖濃 度が低下	-
10021018	代謝および栄養 障害	Hypokalemia	低カリウム血症	<LLN - 3.0 mmol/Lで症状がな い	<LLN - 3.0 mmol/Lで症状が ある; 治療を要する	<3.0 - 2.5 mmol/L; 入院を要する	<2.5 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中カリウム濃 度が低下	-
10021028	代謝および栄養 障害	Hypomagnesemia	低マグネシウム血症	<LLN - 1.2 mg/dL; <LLN - 0.5 mmol/L	<1.2 - 0.9 mg/dL; <0.5 - 0.4 mmol/L	<0.9 - 0.7 mg/dL; <0.4 - 0.3 mmol/L	<0.7 mg/dL; <0.3 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中マグネシウ ム濃度が低下	-
10021038	代謝および栄養 障害	Hyponatremia	低ナトリウム血症	<LLN - 130 mmol/L	125 - <130 mmol/Lで症状が ない	125 - <130 mmol/Lで症状が ある; 120 - <125 mmol/Lで症状の 有無は問わない	<120 mmol/L; 生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中ナトリウム 濃度が低下	-
10021059	代謝および栄養 障害	Hypophosphatemia	低リン血症	検査値異常のみで治療を要さ ない	経口補充療法を要する	重症または医学的に重大であ るが、ただちに生命を脅かすも のではない; 入院または入院 期間の延長を要する	生命を脅かす	死亡	臨床検査にて血中リン濃度が 低下	-
10065973	代謝および栄養 障害	Iron overload	鉄過剰	-	中等度の症状; 治療を要さない	高度の症状; 治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	組織内の鉄の蓄積	-
10027433	代謝および栄養 障害	Metabolism and nutrition disorders - Other, specify	代謝および栄養障害, そ の他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症 状; 臨床所見または検査所見 のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵 襲的治療を要する; 身の回り 以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動へ の軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であ るが、ただちに生命を脅かすも のではない; 入院または入院 期間の延長を要する; 身の回 りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動へ の高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	-	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10045152	代謝および栄養障害	Tumor lysis syndrome	腫瘍崩壊症候群	検査所見による腫瘍崩壊症候群 (LTLS) かつクレアチニン > ULN - 1.5 x ULN	LTLSかつクレアチニン < 1.5 - 3.0 x ULN; 内科的に管理可能な心臓不整脈; 短時間の単回の全般発作; 抗痙攣薬でよくコントロールされた痙攣発作; 頻回ではない焦点性運動発作で年齢相応の身の回り以外の日常生活動作の制限はない; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	LTLSかつクレアチニン > 3.0 - 6.0 x ULN; 機器 (例: 除細動器) により管理可能な心臓不整脈; 意識の変容を伴う痙攣発作; コントロール不良の痙攣発作; 内科的治療によっても生じる治療抵抗性全般発作	LTLSかつクレアチニン > 6.0 x ULN; 生命を脅かす心臓不整脈または痙攣発作	死亡	特発性または治療による腫瘍細胞の崩壊が原因で生じる代謝異常。臨床的腫瘍崩壊症候群 (CTLS) は検査所見による腫瘍崩壊症候群 (LTLS) の規準に加えて1つ以上の臨床症状を有することと定義される。LTLSは化学療法を開始3日前から開始7日後までに以下の2つ以上の検査値異常を有することとされる。尿酸 >= 476 mcmol/Lまたはベースラインから25%増加、カリウム >= 6.0 mmol/Lまたはベースラインから25%増加、リン >= 2.1 mmol/L (小児)/1.45 mmol/L (成人) またはベースラインから25%増加、カルシウム <= 1.75 mmol/L またはベースラインから25%減少	-
10065775	筋骨格系および結合組織障害	Abdominal soft tissue necrosis	腹部軟部組織壊死	-	局所的創傷ケア; 内科的治療を要する (例: ドレッシング, 外用薬)	外科的な壊死組織除去などの侵襲的治療を要する (例: 組織の再建/皮弁/移植)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	腹壁の軟部組織の壊死	-
10003239	筋骨格系および結合組織障害	Arthralgia	関節痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	関節の著しく不快な感覚	炎症性関節炎 (Inflammatory arthritis) は筋骨格系および結合組織障害, その他 (炎症性関節炎) として報告する
10003246	筋骨格系および結合組織障害	Arthritis	関節炎	炎症/紅斑/関節腫脹を伴う軽度の疼痛	炎症/紅斑/関節腫脹を伴う中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	炎症/紅斑/関節腫脹を伴う高度の疼痛; 不可逆的な関節障害; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	関節の炎症	炎症性関節炎 (Inflammatory arthritis) は筋骨格系および結合組織障害, その他 (炎症性関節炎) として報告する
10003988	筋骨格系および結合組織障害	Back pain	背部痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	背部の著しく不快な感覚	注入に伴う反応 (傷害, 中毒および処置合併症) の grading を考慮する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10006002	筋骨格系および結合組織障害	Bone pain	骨痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	骨の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10048677	筋骨格系および結合組織障害	Buttock pain	殿部痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	殿部の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10048831	筋骨格系および結合組織障害	Chest wall necrosis	胸壁壊死	-	局所的創傷ケア; 内科的治療を要する(例: ドレッシング, 外用薬)	外科的な壊死組織除去などの侵襲的治療を要する(例: 組織の再建/皮弁/移植)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	乳房を含む胸壁の軟部組織の壊死	-
10008496	筋骨格系および結合組織障害	Chest wall pain	胸壁痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	胸壁の著しく不快な感覚	炎症性肋軟骨炎は筋骨格系および結合組織障害, その他(炎症性肋軟骨炎)として報告する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10015688	筋骨格系および結合組織障害	Exostosis	外骨腫	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 待機的な外科的処置を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	骨の非腫瘍性過成長	-
10065799	筋骨格系および結合組織障害	Fibrosis deep connective tissue	深部結合組織線維化	軽度の硬結で, 皮膚を水平に動かす(横滑り)ことができ, 垂直に動かす(つまみ上げる)ことができる	中等度の硬結で, 皮膚を横滑りできるが, つまめない; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の硬結で, 皮膚の横滑りもつまみ上げもできない; 関節の動きや開口部の制限(例: 口, 肛門); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	全身性; 呼吸障害や摂食障害の徴候や症状を伴う	死亡	深部結合組織の線維性変性	-
10016750	筋骨格系および結合組織障害	Flank pain	側腹部痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	体の側面で, 肋骨より下部~殿部より上部の領域の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10062572	筋骨格系および結合組織障害	Generalized muscle weakness	全身筋力低下	症状がある; 患者の自覚はあるが, 診察では明らかではない	症状がある; 診察にて明らか; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	複数の解剖学的部位の筋力の低下	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10018761	筋骨格系および結合組織障害	Growth suppression	成長抑制	理想的年間成長速度より10->30%の低下	理想的年間成長速度より30-<50%の低下; ベースライン成長曲線より0-49%の低下	理想的年間成長速度より>=50%の低下	-	-	年齢に応じた体格より小さい	-
10065779	筋骨格系および結合組織障害	Head soft tissue necrosis	頭部軟部組織壊死	-	局所的創傷ケア; 内科的治療を要する(例: ドレッシング, 外用薬)	外科的な壊死組織除去などの侵襲的治療を要する(例: 組織の再建/皮弁/移植)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	頭部の軟部組織の壊死	副鼻腔障害[呼吸器, 胸郭および縦隔障害]のGrade 4のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10023215	筋骨格系および結合組織障害	Joint effusion	関節滲出液	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 侵襲的治療を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	関節内の滲出液過多。通常、関節炎により生じる	-
10048706	筋骨格系および結合組織障害	Joint range of motion decreased	関節可動域低下	関節可動域(ROM)の<=25%減少; 運動に制限あり	関節可動域(ROM)の>25 - 50%減少; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	関節可動域(ROM)の>50%減少; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	関節の可動性の低下	炎症性関節炎(Inflammatory arthritis)は筋骨格系および結合組織障害, その他(炎症性関節炎)として報告する
10065796	筋骨格系および結合組織障害	Joint range of motion decreased cervical spine	頰椎関節可動域低下	回旋または屈曲が60-70°まで軽度に制限される	左または右への回旋が<60°; 屈曲が<60°	複数の頰椎が強直/癒合し、頰椎がまったく回旋できない	-	-		炎症性関節炎(Inflammatory arthritis)は筋骨格系および結合組織障害, その他(炎症性関節炎)として報告する
10065800	筋骨格系および結合組織障害	Joint range of motion decreased lumbar spine	腰椎関節可動域低下	強直; 軽い物を床より拾い上げるための前屈が困難だが運動は可能	腰椎の可動域減少を伴う疼痛; 軽い物を床から拾い上げるために補助具を要する	腰椎の屈曲が<50%; 複数の腰椎が強直/癒合し、腰椎がまったく屈曲しない(例: 軽い物を拾い上げるのに床に手が届かない)	-	-	腰椎関節の可動性の低下	炎症性関節炎(Inflammatory arthritis)は筋骨格系および結合組織障害, その他(炎症性関節炎)として報告する
10023509	筋骨格系および結合組織障害	Kyphosis	脊柱後弯症	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 外科的処置を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	胸部脊椎の弯曲の異常増加	-
10024842	筋骨格系および結合組織障害	Lordosis	脊柱前弯症	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 外科的処置を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	腰部脊椎の弯曲の異常増加	-
10028294	筋骨格系および結合組織障害	Muscle cramp	筋痙攣	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	筋または筋群が著しく痙攣する感覚	シノニム: 筋痙攣/Muscle spasms
10065776	筋骨格系および結合組織障害	Muscle weakness lower limb	下肢筋力低下	症状がある; 患者の自覚はあるが、診察では明らかではない	症状がある; 診察にて明らか; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	下肢の筋力低下	筋炎(筋骨格系および結合組織障害), 免疫系障害, その他(具体的に記載)[免疫系障害], 転倒(傷害, 中毒および処置合併症)のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10065795	筋骨格系および結合組織障害	Muscle weakness trunk	体幹筋力低下	症状がある; 患者の自覚はあるが, 診察では明らかではない	症状がある; 診察にて明らか; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	体幹の筋力低下	筋炎[筋骨格系および結合組織障害], 免疫系障害, その他(具体的に記載)[免疫系障害], 転倒[傷害, 中毒および処置合併症]のgradingを考慮する
10065895	筋骨格系および結合組織障害	Muscle weakness upper limb	上肢筋力低下	症状がある; 患者の自覚はあるが, 診察では明らかではない	症状がある; 診察にて明らか; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	上肢の筋力低下	筋炎[筋骨格系および結合組織障害], 免疫系障害, その他(具体的に記載)[免疫系障害], 転倒[傷害, 中毒および処置合併症]のgradingを考慮する
10028395	筋骨格系および結合組織障害	Musculoskeletal and connective tissue disorder - Other, specify	筋骨格系および結合組織障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10065783	筋骨格系および結合組織障害	Musculoskeletal deformity	筋骨格変形	美容的/機能的に重大でない形成不全	プロステーシス(例: 靴の中敷)で補正または衣服で被覆可能な変形, 形成不全または非対称性	プロステーシスでの補正や衣服での被覆が不可能な重大な変形, 形成不全または非対称性; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	筋骨格系の形成異常	-
10028411	筋骨格系および結合組織障害	Myalgia	筋肉痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	筋または筋群の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10028653	筋骨格系および結合組織障害	Myositis	筋炎	軽度の疼痛	筋力低下を伴う中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の筋力低下を伴う疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	-	骨格筋の炎症	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10028836	筋骨格系および結合組織障害	Neck pain	頸部痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	頸部の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065781	筋骨格系および結合組織障害	Neck soft tissue necrosis	頸部軟部組織壊死	-	局所的創傷ケア; 内科的治療を要する(例: ドレッシング, 外用薬)	外科的な壊死組織除去などの侵襲的治療を要する(例: 組織の再建/皮弁/移植)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	頸部の軟部組織に生じる壊死	-
10031264	筋骨格系および結合組織障害	Osteonecrosis	骨壊死	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する(例: 鎮痛薬またはビスフォスフォネート); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 待機的外科的処置を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	血液の供給の途絶による骨組織の壊死。長管骨骨端に最も多く、壊死性変化は骨構造を崩壊、破壊する	-
10064658	筋骨格系および結合組織障害	Osteonecrosis of jaw	顎骨壊死	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する(例: 外用薬); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 待機的外科的処置を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	下顎骨に生じる壊死	-
10031282	筋骨格系および結合組織障害	Osteoporosis	骨粗鬆症	成人: 画像で骨粗鬆症の所見あり、または骨塩密度(BMD)tスコア -1~-2.5(骨量減少) 小児: BMD zスコア<=-2.0で明らかな骨折の既往がない	成人: BMD tスコア<-2.5; 身長低下が<2 cm; BMDを改善する治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限 小児: BMD zスコア<=-2.0で明らかな骨折の既往がある(下肢の長骨骨折、脊椎圧迫、上肢の長骨の2か所以上の骨折); 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響	成人: 身長低下が>=2 cm; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限 小児: 年齢相応の正常日常生活への高度の影響	-	-	骨皮質の菲薄化、海綿骨の骨梁の数とサイズの減少を伴う骨量の低下(化学組成は正常)。その結果、骨折の頻度が高くなる	-
10033425	筋骨格系および結合組織障害	Pain in extremity	四肢痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	上肢または下肢の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10065793	筋骨格系および結合組織障害	Pelvic soft tissue necrosis	骨盤軟部組織壊死	-	局所的創傷ケア; 内科的治療を要する(例: ドレッシング, 外用薬)	外科的な壊死組織除去などの侵襲的治療を要する(例: 組織の再建/皮弁/移植)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	骨盤の軟部組織に生じる壊死	-
10039020	筋骨格系および結合組織障害	Rhabdomyolysis	横紋筋融解症	症状がなく、治療を要さない; 検査値異常のみ	治療を要するが緊急性はない	症状があり、緊急処置を要する	生命を脅かす; 透析を要する	死亡	筋組織の破壊により筋線維物質が血中に放出される	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v2.8.1 (日本語表記: MedDRA/J v2.8.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10039226	筋骨格系および結合組織障害	Rotator cuff injury	肩回旋筋腱板損傷	症状がない,または軽度の症状;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	中等症;最小限/局所的/非侵襲的治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが,ただちに生命を脅かすものではない;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	肩回旋筋腱板の損傷	-
10039722	筋骨格系および結合組織障害	Scoliosis	側弯症	<=20°; 診察にて指摘できない	>20 - 45°; 前屈時に確認される;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	>45°; 前屈時に肩甲骨が突出;外科的処置を要する;身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	脊椎の側方向のゆがみ	-
10065777	筋骨格系および結合組織障害	Soft tissue necrosis lower limb	下肢軟部組織壊死	-	局所的創傷ケア;内科的治療を要する(例:ドレッシング,外用薬)	外科的な壊死組織除去などの侵襲的治療を要する(例:組織の再建/皮弁/移植)	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	下肢の軟部組織に生じる壊死	-
10065778	筋骨格系および結合組織障害	Soft tissue necrosis upper limb	上肢軟部組織壊死	-	局所的創傷ケア;内科的治療を要する(例:ドレッシング,外用薬)	外科的な壊死組織除去などの侵襲的治療を要する(例:組織の再建/皮弁/移植)	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	上肢の軟部組織に生じる壊死	-
10065798	筋骨格系および結合組織障害	Superficial soft tissue fibrosis	表在軟部組織線維化	軽度の硬結で,皮膚を水平に動かす(横滑り)ことができ,垂直に動かす(つまみ上げる)ことができる	中等度の硬結で,皮膚を横滑りできるが,つまめない;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の硬結で,皮膚の横滑りもつまみ上げもできない;関節の動きや開口部の制限(例:口,肛門);身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	全身性;呼吸障害や摂食障害の徴候や症状を伴う	死亡	表在軟部組織の線維性変性	-
10044684	筋骨格系および結合組織障害	Trismus	トリズムス	摂食障害を伴わない可動域の減少	きざみ食/軟らかい食事/ピューレを必要とする可動域の減少	栄養や水分を十分に経口摂取できない可動域の減少	-	-	咀嚼筋の可動域低下により,口を完全に開けることができない	-
10065738	筋骨格系および結合組織障害	Unequal limb length	肢長不一致	<2 cm の軽度の肢長差	2 - 5 cm の中等度の肢長差;靴底の調節を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	>5 cm の高度の肢長差;身の回りの日常生活動作の制限;外科的処置を要する;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	上肢または下肢の長さの不一致	-
10018746	筋骨格系および結合組織障害	Growth accelerated	成長促進	-	両親の平均身長や規準となる身長の+2SD(標準偏差)以上の成長	-	-	-	年齢相応でない過度の成長	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10080638	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Differentiation syndrome	分化症候群	症状がない, または軽度の症 状; 臨床所見または検査所見 のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵 襲的治療を要する; 年齢相応の身の回り以外の 日常生活動作の制限	重症または医学的に重大であ るが, ただちに生命を脅かすも のではない; 身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	白血病の特定の分子生物学 的サブグループに対する治療 により生じ得る致死的な合併 症で, 発熱, 皮疹, 呼吸困難/低 酸素血症, 肺浸潤, 急激な体 重増加を伴う末梢浮腫, 胸水/ 心嚢水, 急性腎不全, 播種性 血管内凝固(DIC), 骨痛, 低血 圧を特徴とする	-
10023347	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	keratoacanthoma	ケラトアカントーマ	-	あり	-	-	-	典型的には, 中央に角質で満 たされた陥凹(クレーター)を 伴うドーム状の結節を呈する 皮膚腫瘍	-
10048293	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Leukemia secondary to oncology chemotherapy	癌化学療法に続発した 白血病	-	-	-	あり	死亡	化学療法薬の変異原性により 生じた白血病	-
10028533	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Myelodysplastic syndrome	骨髄異形成症候群	-	-	-	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	骨髄で正常造血細胞が十分 に産生されない	-
10029104	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) - Other, specify	良性, 悪性および詳細 不明の新生物(嚢胞お よびポリープを含む), そ 他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症 状; 臨床所見または検査所見 のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵 襲的治療を要する; 身の回り 以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であ るが, ただちに生命を脅かすも のではない; 入院または入院 期間の延長を要する; 身の回 りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	-	-
10040907	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Skin papilloma	皮膚乳頭腫	症状がなく, 治療を要さない	治療を要する	-	-	-	1つ以上, 疣贅がある	-
10049737	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Treatment related secondary malignancy	治療関連続発性悪性疾 患	-	-	生命を脅かさな二次がん	急性に生命を脅かす二 次がん; 白血病急性転 化	死亡	過去にあった悪性腫瘍に対す る治療が原因と考えられる続 発性の悪性腫瘍	-
10055351	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Tumor hemorrhage	腫瘍出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	腫瘍内の出血	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10045158	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Tumor pain	腫瘍疼痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外 の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	-	-	悪性腫瘍による, 神経の圧迫, 血管の遮断, 転移巣の炎症や 骨折で生じ得る著しく不快な 感覚	確定診断/原因特定がされた 場合はそれを記録すること
10038921	良性, 悪性および 詳細不明の新生 物(嚢胞およびポ リープを含む)	Retinoic acid syndrome	レチノイン酸症候群	水分貯留; <3 kgの体重増加; 水分摂取制限および/または 利尿薬による治療を要する	中等度の徴候または症状; 副 腎皮質ステロイドを要する	高度の症状; 入院を要する	生命を脅かす; 人工呼 吸を要する	死亡	オールトランスレチノイン酸で 治療する患者に認められる, 体重増加, 呼吸困難, 胸水, 心 嚢液, 白血球増加および/また は腎不全	-
10053662	神経系障害	Abducens nerve disorder	外転神経障害	症状がない; 臨床所見または 検査所見のみ; 治療を要さな い	中等度の症状; 身の回り以外 の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	-	-	外転神経(第6脳神経)の障害	末梢性運動ニューロパチー, 末梢性感覚ニューロパチー[神 経系障害]のgradingを考慮す る
10060929	神経系障害	Accessory nerve disorder	副神経障害	症状がない; 臨床所見または 検査所見のみ; 治療を要さな い	中等度の症状; 身の回り以外 の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	-	-	副神経(第11脳神経)の障害	末梢性運動ニューロパチー, 末梢性感覚ニューロパチー[神 経系障害]のgradingを考慮す る
10000521	神経系障害	Acoustic nerve disorder NOS	聴神経障害NOS	症状がない; 臨床所見または 検査所見のみ; 治療を要さな い	中等度の症状; 身の回り以外 の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	-	-	聴神経(第8脳神経)の障害	末梢性運動ニューロパチー, 末梢性感覚ニューロパチー[神 経系障害]のgradingを考慮す る
10001540	神経系障害	Akathisia	アカシジア	軽度の多動または運動過多	中等度の多動または運動過 多; 身の回り以外の日常生活 動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度の多動または運動過多; 身の回りの日常生活動作の 制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	-	-	落ち着かず, じっとしていること ができない不快な感覚があ る。ある種の精神刺激薬の副 作用	-
10001949	神経系障害	Amnesia	健忘	軽度; 一時的な記憶の喪失	中等度; 短期間の記憶の喪 失; 身の回り以外の日常生活 動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度; 長期間の記憶の喪失; 身の回りの日常生活動作の 制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	-	-	系統的で広範囲の記憶の喪 失	-
10002653	神経系障害	Anosmia	無嗅覚	あり	-	-	-	-	嗅覚の変化	嗅神経障害[神経系障害]の gradingを考慮する
10003074	神経系障害	Arachnoiditis	くも膜炎	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外 の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処 置を要する	死亡	くも膜とくも膜下腔の炎症	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10003591	神経系障害	Ataxia	運動失調	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 機械的な支援を必要とする; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	筋運動の協調性の欠如により生じる随意運動の障害や不能	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10061666	神経系障害	Autonomic neuropathy	自律神経ニューロパチー	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	内臓器官を制御する神経系の障害	-
10065417	神経系障害	Brachial plexopathy	腕神経叢障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	腕神経叢領域の感覚異常, 著しい不快, 筋力低下と腕/手の動作の制限	-
10088940	神経系障害	Brain fog	ブレインフォグ	あり	身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	-	-	-	がん患者のがん治療中または治療後に生じる思考や記憶の障害	-
10065784	神経系障害	Central nervous system necrosis	中枢神経系壊死	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 副腎皮質ステロイドを要する	高度の症状; 内科的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳および/または脊髄に生じる壊死	-
10083037	神経系障害	Cerebral venous sinus thrombosis	大脳静脈洞血栓症	-	治療を要さない	内科的治療を要する(例: 抗凝固療法)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳浮腫や脳出血を生じ得る脳静脈洞の血栓	-
10008164	神経系障害	Cerebrospinal fluid leakage	脳脊髄液漏	開頭術後: 症状がない; 腰椎穿刺後; 一過性の頭痛; 体位変換のケアを要する	開頭術後: 中等度の症状; 内科的治療を要する; 腰椎穿刺後: 継続する中等度の症状; ブラッドパッチを要する	高度の症状; 内科的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳脊髄液の周囲組織への漏出	-
10009845	神経系障害	Cognitive disturbance	認知障害	軽度の認知障害; 作業/学業/日常生活に支障がない; 特別な教育/器具は要さない	中等度の認知障害; 作業/学業/日常生活に支障があるが、自立した生活は可能; 専門職員による短時間の定期的ケアを要する	高度の認知障害; 作業/学業/日常生活に重大な障害	-	-	認知機能の著しい変化	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10010250	神経系障害	Concentration impairment	集中力障害	軽度の注意散漫または集中力低下	中等度の注意散漫または集中力低下; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の注意散漫または集中力低下; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	集中力の低下	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10012373	神経系障害	Depressed level of consciousness	意識レベルの低下	注意力の低下	鎮静; 刺激に対する反応の低下; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	覚醒困難	生命を脅かす; 昏睡; 緊急処置を要する	死亡	知覚と反応の低下	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10013573	神経系障害	Dizziness	浮動性めまい	軽度の浮遊感または身体が動く感覚	中等度の浮遊感または身体が動く感覚; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の浮遊感または身体が動く感覚; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	浮遊感, ふらつき, 目のくらみ, 回転する感覚, 揺れる感覚などの症状	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10013887	神経系障害	Dysarthria	構語障害	軽度に不明瞭な発語	中等度の発語障害または不明瞭な発語	高度の発語障害または不明瞭な発語	-	-	発語に用いる筋肉の協調ができず発語が緩徐かつ不明瞭となる	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10062872	神経系障害	Dysesthesia	異常感覚	軽度の感覚変化	中等度の感覚変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の感覚変化; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	感覚性認知障害による異常または不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10013911	神経系障害	Dysgeusia	味覚不全	食生活の変化を伴わない味覚変化	食生活の変化を伴う味覚変化(例: 経口サプリメント); 不快な味, 味の消失	-	-	-	食物の味に関する異常知覚。嗅覚の低下によることがある	-
10013951	神経系障害	Dysphasia	不全失語症	理解や表現の鈍麻, コミュニケーション能力の低下は伴わない	中等度の理解や表現の鈍麻; 自発的コミュニケーション能力の低下	高度の理解や表現の鈍麻; 読み書きや知的なコミュニケーションに支障がある	読み書きや知的なコミュニケーションがまったくできない	-	言語による意思疎通能力の障害。脳の障害によることが多い	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10014217	神経系障害	Edema cerebral	脳浮腫	画像所見のみで内科的治療を要さない	-	新規発症; ベースラインから悪化; 副腎皮質ステロイドを要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	過剰な水分貯留による脳の腫脹	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10014625	神経系障害	Encephalopathy	脳症	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳の病的変化	-
10015832	神経系障害	Extrapyramidal disorder	錐体外路障害	軽度の不随意運動がある	中等度の不随意運動がある; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の不随意運動または斜頸がある; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	異常な反復する不随意運動, 暴力的な発言, 著しい落ち着きのなさ	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10051272	神経系障害	Facial muscle weakness	顔面筋脱力	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	顔面筋の筋力低下	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10061457	神経系障害	Facial nerve disorder	顔面神経障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	顔面神経(第7脳神経)の障害	-
10061185	神経系障害	Glossopharyngeal nerve disorder	舌咽神経障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	舌咽神経(第9脳神経)の障害	-
10018767	神経系障害	Guillain-Barre syndrome	ギラン・バレー症候群	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	身体の免疫系が末梢神経系を攻撃し, 上向性麻痺を伴う状態	-
10019211	神経系障害	Headache	頭痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	神経の支配領域に限局しない頭部の様々な部位の著しい不快感	-
10019465	神経系障害	Hemiparesis	不全片麻痺	症状がある; 患者の自覚はあるが診察では明らかではない	症状がある; 診察にて明らか; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	体の片側の筋肉の筋力の減弱	-
10020508	神経系障害	Hydrocephalus	水頭症	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要さない	高度の症状または神経障害; 治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳室の脳脊髄液の異常増加	-
10020765	神経系障害	Hypersomnia	過眠症	睡眠に対する欲求の軽度増加	睡眠に対する欲求の中等度増加	睡眠に対する欲求の高度増加	-	-	日中の過度な眠気	-
10061212	神経系障害	Hypoglossal nerve disorder	舌下神経障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	舌下咽神経(第12脳神経)の障害	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10083347	神経系障害	Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome	免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群	軽度の症状; 免疫エフェクター細胞関連脳症 (Immune Effector Cell-Associated Encephalopathy: ICE) スコア7-9; コーネル小児譫妄評価 (Cornell Assessment of Pediatric Delirium: CAPD) スコア1-8かつ自発的に覚醒している	中等度の症状; ICEスコア3-6; CAPDスコア1-8かつ声掛けにより覚醒する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の症状; ICEスコア0-2; CAPDスコア>=9かつ触った刺激でしか覚醒しない; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	内因性または輸注されたT細胞やその他の免疫エフェクター細胞の活性化や作用につながる免疫療法後に生じる中枢神経系の異常な病態。症状や徴候は進行性となり得て、失語、意識レベルの変化、認知機能障害、運動麻痺、痙攣発作、脳浮腫が生じ得る	-
10022763	神経系障害	Intracranial hemorrhage	頭蓋内出血	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	脳室開窓術/頭蓋内圧モニタリング/脳室内血栓溶解/侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	頭蓋内の出血	-
10024264	神経系障害	Lethargy	嗜眠	軽度の症状; 注意力と意識の低下	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	-	-	-	精神的、肉体的な活動性低下を特徴とする意識レベルの低下	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10024382	神経系障害	Leukoencephalopathy	白質脳症	症状がない; T2/FLAIR強調像での小さな高信号域; 脳室周囲白質, または<1/3の大脳白質を含む; 軽度のくも膜下腔拡大; 軽度の脳室拡大	中等度の症状; 半卵円中心に至る脳室周囲白質または1/3から2/3の大脳白質を含んだT2/FLAIR 強調像の高信号域; 中等度のくも膜下腔拡大; 中等度の脳室拡大	高度の症状; 脳室周囲白質, 2/3を超えて大脳白質を含んだT2/FLAIR 強調像の広い高信号域; 中等度から高度のくも膜下腔拡大; 中等度から高度の脳室拡大	生命を脅かす; 脳室周囲白質, ほとんどの大脳白質を含むT2/FLAIR 強調像の広い高信号域; 高度のくも膜下腔拡大; 高度の脳室拡大	死亡	非炎症性の多発壊死巣を伴う、びまん性反応性の星状膠細胞の増多	-
10027175	神経系障害	Memory impairment	記憶障害	軽度の記憶障害	中等度の記憶障害; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	記憶機能の低下	-
10027198	神経系障害	Meningismus	髄膜炎	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳髄膜炎の刺激による項部硬直, 頭痛, 羞明	-
10028041	神経系障害	Movements involuntary	不随意運動	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	制御不能で無目的な運動	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10028417	神経系障害	Myasthenia gravis	重症筋無力症	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	あらゆる骨格筋の筋力低下や急激な疲労	-
10029205	神経系障害	Nervous system disorders - Other, specify	神経系障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10029223	神経系障害	Neuralgia	神経痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	1本または複数の神経に沿った強い痛みを感じる	-
10029864	神経系障害	Nystagmus	眼振	-	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	眼球の不随意運動	-
10053661	神経系障害	Oculomotor nerve disorder	動眼神経障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	動眼神経(第3脳神経)の障害	-
10056388	神経系障害	Olfactory nerve disorder	嗅神経障害	-	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	-	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10030942	神経系障害	Optic neuritis	視神経炎	症状がない、または軽度の症状; 視力の変化を伴わずMRIでの増強のみ	治療を要する; 罹患眼の最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが、ただちに視覚喪失を来す可能性は高くない; 罹患眼の視力低下(最高矯正視力0.5未満, 0.1を超える、または既知のベースラインから3段階を超える視力低下); 終口の副腎皮質ステロイドを要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	視覚喪失の可能性が高い状態; 緊急処置を要する; 罹患眼の最高矯正視力0.1以下; 有意な視野欠損; 著明な視神経乳頭浮腫またはMRIでの増強; 静注の副腎皮質ステロイドを要する; 失明	-	急性の通常は片側眼の視力障害を来す視神経の炎症と脱髄	-
10033987	神経系障害	Paresthesia	錯感覚	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	刺痛, 麻痺, 圧迫感, 冷感, 温感等を感じる知覚ニューロンの機能障害	末梢性運動ニューロパチー, 末梢性感覚ニューロパチー[神経系障害]のgradingを考慮する
10034580	神経系障害	Peripheral motor neuropathy	末梢性運動ニューロパチー	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	末梢運動神経の損傷または機能障害	末梢性感覚ニューロパチー[神経系障害]のgradingを考慮する
10034620	神経系障害	Peripheral sensory neuropathy	末梢性感覚ニューロパチー	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	-	末梢知覚神経の損傷または機能障害	-
10056238	神経系障害	Phantom pain	幻痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	切除されたまたは物理的に身体の一部ではない四肢や臓器に起因する著しい不快感	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10036653	神経系障害	Presyncope	失神寸前の状態	-	症状がある(例: 失神しそうな状態)	-	-	-	失神のエピソードに先行するめまいやふらつき	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10063636	神経系障害	Pyramidal tract syndrome	錐体路症候群	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脊髄の錐体路障害。下肢の筋緊張, 反射亢進, Babinski陽性, 細かい協調運動の低下を来す	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10061928	神経系障害	Radiculitis	神経根炎	軽度の症状	中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	神経根の炎症。神経根に接する脊髄の圧迫により起こる、神経走行に沿った著しい不快感	-
10038130	神経系障害	Recurrent laryngeal nerve palsy	反回神経麻痺	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状	高度の症状; 内科的治療を要する(例: 甲状軟骨形成術, 声帯注射)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	反回神経の麻痺による障害	-
10063761	神経系障害	Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome	可逆性後白質脳症症候群	-	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	後白質脳症の画像所見を伴う頭痛、精神状態の変化、視覚障害、痙攣発作。高血圧性脳症、子癇、免疫抑制療法や細胞傷害性抗がん薬に関連して観察される。急性または亜急性で可逆性 Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)としても知られている	-
10039906	神経系障害	Seizure	痙攣発作	短い部分/局点性痙攣発作はあるが、意識障害はない	短い全般痙攣発作; 抗痙攣薬でよくコントロールされた痙攣発作; 頻回ではない部分/局点性運動痙攣発作	痙攣発作の新規発症(部分/局点性痙攣発作または全般痙攣発作); 内科的治療を行っているにもかかわらず繰り返しかつ起こる痙攣発作	生命を脅かす; 遷延する全般痙攣発作の重積状態	死亡	大脳または脳幹由来の、突然の不随意的な骨格筋の痙攣	-
10041349	神経系障害	Somnolence	傾眠	普段より傾眠/眠気があるが軽度	中等度の鎮静; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	鈍麻/混迷	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	過度の眠気と傾眠	-
10041416	神経系障害	Spasticity	痙直	軽度/わずかな筋緊張亢進	中等度の筋緊張亢進と可動域全体にわたる抵抗の増大	高度の筋緊張亢進と可動域全体にわたる抵抗の増大	生命を脅かす; 自動他動可動域全体にわたる動作不能	死亡	随意運動を妨げる不随意的な筋緊張。歩行障害、運動障害、言語障害を起こす	-
10041549	神経系障害	Spinal cord compression	脊髄圧迫	画像所見のみ	軽度または中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脊髄の圧迫	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10042244	神経系障害	Stroke	脳卒中	偶発的な画像所見のみ	軽度から中等度の神経障害; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の神経障害; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	脳の一部への血液供給の中断による神経組織の障害	-
10042772	神経系障害	Syncope	失神	-	-	失神; 起立性の卒倒	-	-	脳への血液供給不足による自然発生的な意識消失	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10043245	神経系障害	Tendon reflex decreased	腱反射減退	アキレス腱反射の低下	アキレス腱反射の消失; 他の反射の低下	すべての反射の消失	-	-	深部腱反射が正常より低下	末梢性運動ニューロパチー, 末梢性感覚ニューロパチー [神経系障害]のgradingを考慮する
10044391	神経系障害	Transient ischemic attacks	一過性脳虚血発作	軽度の神経障害がある。画像所見の有無は問わない	中等度の神経障害がある。画像所見の有無は問わない	-	-	-	永続的な神経障害を伴わない, 短時間(24時間未満)の血管性の脳機能不全	24時間を超える場合, 脳卒中 [神経系障害]のgradingを考慮する
10044565	神経系障害	Tremor	振戦	軽度の症状	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	全身または身体の一部の制御不能の振動運動	-
10060890	神経系障害	Trigeminal nerve disorder	三叉神経障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	三叉神経(第5脳神経)の障害	-
10074765	神経系障害	Trochlear nerve disorder	滑車神経障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	滑車神経(第4脳神経)の障害	-
10091322	神経系障害	Tumor inflammation-associated neurotoxicity	腫瘍炎症関連神経毒性	発熱を伴う頭痛; 経過観察のみまたは症状の管理を要する軽度の機能的障害を来す既存の神経学的臨床徴候および症状のベースラインからの軽度の悪化	顕著に機能に影響する神経学的所見のベースラインからの中等度の変化	心肺機能に危機的な影響を及ぼす高度の神経学的徴候および症状; 治療に反応する脳圧亢進(>20 mmHg)の臨床徴候および症状	生命を脅かす臨床的に有意な脳圧亢進(>20 mmHg)で, 脳脊髄液ドレナージに抵抗性を示し, 症状の改善も認められず, 緊急の脳神経外科的介入を要する可能性がある;	死亡	中枢神経系の腫瘍に対する細胞療法や他の免疫療法によって生じる局所的な神経毒性	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10061403	神経系障害	Vagus nerve disorder	迷走神経障害	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	迷走神経(第10脳神経)の障害	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10047166	神経系障害	Vasovagal reaction	血管迷走神経性反応	-	管理を要さない	積極的な管理を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	突然の血圧低下, 徐脈, 末梢血管拡張で, 意識消失を生じ得る。迷走神経刺激の亢進による	-
10054746	妊娠, 産褥および周産期の状態	Fetal growth retardation	胎児発育遅延	-	胎児の推定体重が在胎週数に応じた体重分布の5-10パーセントイル	胎児の推定体重が在胎週数に応じた体重分布1-5パーセントイル	胎児の推定体重が在胎週数に応じた体重分布の<1パーセントイル	-	胎児発育の遅延により胎児が得るべきレベルの体重が得られない	-
10072314	妊娠, 産褥および周産期の状態	Pregnancy loss	妊娠喪失	-	-	-	妊娠期間中の胎児死亡	-	子宮内の死亡	-
10036585	妊娠, 産褥および周産期の状態	Pregnancy, puerperium and perinatal conditions - Other, specify	妊娠, 産褥および周産期の状態, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等度; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10036595	妊娠, 産褥および周産期の状態	Premature delivery	早産	妊娠>34-37週の生産児分娩	妊娠>28-34週の生産児分娩	妊娠24-28週の生産児分娩	妊娠<24週の生産児分娩	-	正常の妊娠期間で出産された生産児。一般に, 妊娠20週から37週での出産児は生存可能である	-
10001497	精神障害	Agitation	激越	軽度の気分変動	中等度の気分変動	高度の興奮状態; 入院を要さない	生命を脅かす; 緊急処置を要する	-	いらいらや緊張といった不快感を伴う情動不安の状態	-
10002652	精神障害	Anorgasmia	無オルガズム症	オルガズムがない, ただしパートナーとの関係には影響がない	オルガズムがなくパートナーとの関係に悪影響	-	-	-	オルガズムに達することが不能	-
10002855	精神障害	Anxiety	不安	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 入院を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	-	明確に特定できる刺激とは関連しない情動不安, 緊張, 頻脈, 呼吸困難を伴う危機感や恐怖感	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10010300	精神障害	Confusion	錯乱	軽度の見当識障害	中等度の見当識障害; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への軽度/中等度の影響(小児)	高度の見当識障害; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	-	明確で理論的な考えや行動の喪失	-
10057066	精神障害	Delayed orgasm	オルガズム遅延	オルガズム遅延があるがパートナーとの関係には影響がない	オルガズムが遅延しパートナーとの関係に悪影響	-	-	-	オルガズムの遅延を特徴とする性的機能不全	-
10012218	精神障害	Delirium	譫妄	軽度の急性の混乱状態	中等度の急性の混乱状態; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への軽度/中等度の影響(小児)	高度の急性の混乱状態; 入院を要する; 緊急処置を要する; 新規発症; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 自傷他害の危険がある; 緊急処置を要する	死亡	急性かつ突然に起こる混乱, 幻想, 行動の変化, 不熱心, 興奮, 幻覚. 通常は可逆性	-
10012260	精神障害	Delusions	妄想	-	中等度の妄想	高度の妄想; 外来加療が可能; 新規発症	生命を脅かす; 自傷他害の危険がある; 入院を要する	死亡	証拠や常識とは矛盾しているにもかかわらず, 現実に反する誤った個人的な信念	-
10012378	精神障害	Depression	うつ病	軽度のうつ症状	中等度のうつ症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への軽度/中等度の影響(小児)	高度のうつ症状; 入院を要さない; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 自傷他害の危険がある; 入院を要する	死亡	悲嘆/不幸といった, もの悲しい感情を特徴とする疾患	-
10015533	精神障害	Euphoria	多幸症	軽度の気分の高揚	中等度の気分の高揚	高度の気分の高揚(例: 軽躁)	-	-	出来事や刺激に不相応な過剰な幸福感	-
10019077	精神障害	Hallucinations	幻覚	軽度の幻覚がある(例: 知覚変容)	中等度の幻覚	高度の幻覚; 入院を要さない	生命を脅かす; 自傷他害の危険がある; 入院を要する	死亡	外部刺激がないにもかかわらず生じる誤った感覚を認識	-
10022437	精神障害	Insomnia	不眠症	軽度の入眠障害/覚醒持続/早朝覚醒	中等度の入眠障害/覚醒持続/早朝覚醒	高度の入眠障害/覚醒持続/早朝覚醒	-	-	入眠が困難および/または覚醒状態の持続	-
10022998	精神障害	Irritability	易刺激性	軽症; 簡単に治まる	中等症; 注意深い観察を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への軽度/中等度の影響(小児)	高度の異常または過剰な反応; 鎮められない; 内科的治療または精神医学的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常活動への高度の影響(小児)	-	-	刺激やある生理的な状況に対する異常な反応. 疼痛, 恐怖, 薬物, ある感情的な状況, 特定の医学的条件に対する反応など	-
10024419	精神障害	Libido decreased	リビドー減退	性欲の低下はあるがパートナーとの関係には影響がない	性欲が低下しパートナーとの関係に悪影響	-	-	-	性的欲求の低下	-
10024421	精神障害	Libido increased	リビドー亢進	あり	-	-	-	-	性的欲求の増加	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10026749	精神障害	Mania	躁病	軽度の躁症状(例: 気分の高揚, 思考が速くなる, 早口, 睡眠時間の短縮)	中等度の躁症状(例: 人間関係維持や仕事が困難, 不衛生)	高度の躁症状(例: 軽躁, 性的/金銭的な重大な無分別); 入院を要さない; 新規発症	生命を脅かす; 自傷他害の危険がある; 入院を要する	死亡	精神的肉体的な過活動状態を伴う病的な興奮状態で, 高揚した気分と行動との間のバランスを欠く	-
10034719	精神障害	Personality change	人格変化	軽度の人格変化	中等度の人格変化	高度の人格変化; 入院を要さない	生命を脅かす; 自傷他害の危険がある; 入院を要する	-	人の行動や考えの著しい変化	-
10037175	精神障害	Psychiatric disorders - Other, specify	精神障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 入院を要する; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10037234	精神障害	Psychosis	精神病	軽度の精神症状	中等度の精神症状(例: 支離滅裂な発語; 現実見当障害)	高度の精神病性の症状(例: 妄想; 極端な分裂); 入院を要さない; 新規発症	生命を脅かす; 自傷他害の危険がある; 入院を要する	死亡	人格の変化, 機能障害, 現実との接点の喪失. 統合失調症, 双極性障害, 脳腫瘍が原因のことが多い	-
10038743	精神障害	Restlessness	落ち着きのなさ	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	休息したり, リラックスしたり, じっとしていることができない	-
10042458	精神障害	Suicidal ideation	自殺念慮	自殺願望はないが, 死を考えたことが増加	特定の計画や意図のない自殺念慮	真剣に死を望んでいる訳ではないが特定の自殺の計画がある; 入院を要さない	真剣に死を意図した特定の自殺の計画がある; 入院を要する	-	自分の人生を終わらそうとする考え	-
10042464	精神障害	Suicide attempt	自殺企図	-	-	死を意図した訳ではない自殺企図やそのしぐさ	入院を要する, 死を意図した自殺企図	死亡	自分の人生を終わらそうとする自己危害の試み	-
10069339	腎および尿路障害	Acute kidney injury	急性腎障害	-	-	入院を要する	生命を脅かす; 人工透析を要する	死亡	急性(2週間以内)の腎機能低下	クレアチニン増加[臨床検査], 尿細管間質性腎炎[腎および尿路障害]のgradingを考慮する
10063575	腎および尿路障害	Bladder perforation	膀胱穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 臓器不全; 緊急の外科的処置を要する	死亡	膀胱壁の破裂	-
10048994	腎および尿路障害	Bladder spasm	膀胱痙縮	治療を要さない	鎮痙薬を要する	入院を要する	-	-	突然かつ不随意の膀胱壁の収縮	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10064848	腎および尿路障害	Chronic kidney disease	慢性腎臓病	GFR推定値またはクレアチニンクリアランスが<LLN-60 mL/min/1.73 m ² または蛋白尿が2+; 尿蛋白/クレアチニン比>0.5	GFR推定値またはクレアチニンクリアランスが<60-30 mL/min/1.73 m ²	GFR推定値またはクレアチニンクリアランスが<30-15 mL/min/1.73 m ²	GFR推定値またはクレアチニンクリアランスが<15 mL/min/1.73 m ² ; 人工透析/腎移植を要する	死亡	3か月を超えて持続する腎機能の低下	-
10063057	腎および尿路障害	Cystitis noninfective	非感染性膀胱炎	顕微鏡的血尿; 排尿回数/尿意切迫/排尿困難/夜間排尿の回数の軽微な増加; 失禁の新規発症	中等度の血尿; 排尿回数/尿意切迫/排尿困難/夜間排尿または失禁の回数の中程度の増加; 尿路カテーテル留置/膀胱洗浄を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	肉眼的血尿; 輸血/薬剤の静脈内投与/入院を要する; 機械的侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急の侵襲的治療を要する	死亡	尿路感染症によるものを除く膀胱の炎症	-
10013990	腎および尿路障害	Dysuria	排尿困難	あり	-	-	-	-	排尿痛	感染と関連がある場合はその感染を報告する Grade 2以上では以下のgradingを考慮する 膀胱痙攣, 非感染性膀胱炎 [腎および尿路障害], 尿路感染 [感染症および寄生虫症]
10018364	腎および尿路障害	Glomerulonephritis	糸球体腎炎	症状がない; 検査所見のみ	糸球体濾過率(GFR)低下; 浮腫; 高血圧; 経口薬治療を要する	静脈内投与による治療を要する; 免疫抑制薬を要する; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する; 腎代替療法(透析・腎移植)を要する	死亡	通常, 腎生検により診断される糸球体の炎症	-
10068405	腎および尿路障害	Glucosuria	糖尿	あり	-	-	-	-	臨床検査で尿中に糖が認められる状態	-
10019450	腎および尿路障害	Hematuria	血尿	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 尿路カテーテル留置/膀胱洗浄を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	肉眼的血尿; 輸血/薬剤の静脈内投与/入院を要する; 機械的侵襲的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急の侵襲的治療を要する	死亡	臨床検査で尿中に血液が認められる状態	-
10019489	腎および尿路障害	Hemoglobinuria	ヘモグロビン尿	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	-	-	-	-	臨床検査で尿中に遊離ヘモグロビンが認められる状態	Grade 2以上では原因となる有害事象を報告する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10029164	腎および尿路障害	Nephrotic syndrome	ネフローゼ症候群	-	-	静脈内投与による治療を要する;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす;緊急処置を要する;腎代替療法(透析・腎移植)を要する;全身浮腫	死亡	高度の浮腫,蛋白尿,低アルブミン血症がある;腎機能障害を示唆する	-
10029446	腎および尿路障害	Nocturia	夜間頻尿	あり	-	-	-	-	夜間に繰り返し起きて排尿する必要がある状態	-
10038359	腎および尿路障害	Renal and urinary disorders - Other, specify	腎および尿路障害,その他(具体的に記載)	症状がない,または軽度の症状;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	中等症;最小限/局所的/非侵襲的治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが,ただちに生命を脅かすものではない;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	-	-
10038385	腎および尿路障害	Renal calculi	腎結石	症状がない,または軽度の症状;市販の鎮痛薬の不定期使用を要する	症状がある;経口制吐薬を要する;連続的に市販の鎮痛薬/経口麻薬性鎮痛薬を要する	入院を要する;静脈内投与による治療を要する(例:鎮痛薬,制吐薬);待機的侵襲的治療を要する	生命を脅かす;緊急の侵襲的治療を要する	死亡	腎盂における結晶の析出/腎結石	-
10038419	腎および尿路障害	Renal colic	腎仙痛	活動に支障がない軽度の疼痛;市販の医薬品を要する	中等度の疼痛;身の回り以外の日常生活動作の制限;処方薬を要する; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	入院を要する;身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	側腹部から鼠径部に放散する発作的で高度な着しい不快感。しばしば結晶/腎結石の通過により発現する	-
10038463	腎および尿路障害	Renal hemorrhage	腎出血	軽度の症状;治療を要さない	鎮痛薬およびヘマトクリットのモニタリングを要する	入院を要する	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	腎臓からの出血	-
10048302	腎および尿路障害	Tubulointerstitial nephritis	尿細管間質性腎炎	クレアチニン上昇を伴わない検査所見のみ	クレアチニン上昇;副腎皮質ステロイドを含む経口薬治療を要する	静脈内投与による治療を要する;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす;緊急処置を要する	死亡	腎尿細管および周囲組織の炎症	-
10065368	腎および尿路障害	Urinary fistula	尿瘻	-	症状があるが,侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす;緊急の侵襲的治療を要する	死亡	泌尿器系のいずれかの部位と他の器官/解剖学的部位との病的な交通	-
10046539	腎および尿路障害	Urinary frequency	頻尿	あり	内科的治療を要する;身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	-	-	-	排尿間隔が短い	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10046543	腎および尿路障害	Urinary incontinence	尿失禁	偶発的 (例: 咳、くしゃみなどに伴う)、パッドを要さない	自然尿失禁; パッドを要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	治療を要する (例: クランプ、コラーゲン注入); 外科的処置を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	膀胱からの尿の流れがコントロールできない状態	-
10046555	腎および尿路障害	Urinary retention	尿閉	尿路カテーテル/恥骨上カテーテル/間欠的カテーテルの留置を要さない; 多少の残尿があるが排尿できる	尿路カテーテル/恥骨上カテーテル/間欠的カテーテルの留置を要する; 薬物治療を要する	待機的侵襲的治療を要する; 罹患腎の腎機能または腎体積の大幅な低下	生命を脅かす; 臓器不全; 緊急の外科的処置を要する	死亡	排尿不能に伴う膀胱への尿の貯留	-
10061574	腎および尿路障害	Urinary tract obstruction	尿路閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが、水腎症、敗血症、腎機能障害を伴わない; 尿道拡張術/尿路カテーテル/恥骨上カテーテルを要する	臓器機能の変化 (例: 水腎症、腎機能障害); 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	尿路内の正常な流れの途絶	-
10062225	腎および尿路障害	Urinary tract pain	尿路痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	尿路の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10046593	腎および尿路障害	Urinary urgency	尿意切迫	あり	内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	-	-	-	突然の切迫した尿意	-
10046628	腎および尿路障害	Urine discoloration	尿変色	あり	-	-	-	-	尿の色の変化	-
10001927	生殖系および乳房障害	Amenorrhea	無月経	-	あり	-	-	-	少なくとも3月経周期の間、月経がない病的状態	-
10003883	生殖系および乳房障害	Azoospermia	無精子症	-	精液中の精子の欠如	-	-	-	臨床検査で精液中に精子が認められない状態	-
10006298	生殖系および乳房障害	Breast pain	乳房痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	乳房領域の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10013934	生殖系および乳房障害	Dysmenorrhea	月経困難症	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	月経中の異常な腹痛	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10013941	生殖系および乳房障害	Dyspareunia	性交困難	陰挿入時の軽度の不快感/疼痛; 陰潤滑剤/エストロゲンの使用により軽減する不快感	陰挿入時の中等度の不快感/疼痛; 陰潤滑剤/エストロゲンの使用により一部軽減する不快感または疼痛	陰挿入時の高度の不快感/疼痛; 陰潤滑剤/エストロゲンを使用しても軽減されない不快感または疼痛	-	-	痛みを伴う性交/性交困難	-
10014326	生殖系および乳房障害	Ejaculation disorder	射精障害	射精機能の減弱	無射精または逆行性射精	-	-	-	射精に関係する問題。早漏, 遅漏, 逆行性射精, 射精時疼痛が含まれる	-
10061461	生殖系および乳房障害	Erectile dysfunction	勃起不全	勃起機能の低下(頻度/硬度)。ただし治療を要さない(例: 薬物治療/機器, 陰茎ポンプの使用)	勃起機能の低下(頻度/硬度)。勃起補助治療を要する(例: 薬物治療/陰茎ポンプなどの機器)	勃起機能の低下(頻度/硬度)。ただし勃起補助治療が有効でない(例: 薬物治療/陰茎ポンプなどの機器); 陰茎プロステーシスの永久留置を要する(以前は不要)	-	-	性行為の際の持続的または反復性の勃起不能/勃起維持不能状態	-
10065789	生殖系および乳房障害	Fallopian tube obstruction	卵管閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 待機的処置を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	-	-	卵管内の正常な流れの途絶	-
10054382	生殖系および乳房障害	Feminization acquired	後天性女性化	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	-	-	-	外的要因により第二次女性性徴が男性で認められる障害	-
10018801	生殖系および乳房障害	Gynecomastia	女性化乳房	症状がない	症状がある(例: 疼痛, 社会心理学的な影響)	高度の症状; 待機的外科的処置を要する	-	-	男性の乳房の過剰な発達	-
10060602	生殖系および乳房障害	Hematosalpinx	卵管留血症	画像検査/腹腔鏡検査で認められる軽微な出血; 治療を要さない	中等度の出血; 内科的治療を要する	侵襲的治療を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	卵管内に血液が貯留している状態	-
10022992	生殖系および乳房障害	Irregular menstruation	不規則月経	連続3月経周期以下の無月経を伴う間欠的/不規則な月経	連続3月経周期を超える無月経を伴う間欠的/不規則な月経	-	-	-	月経周期や月経期間のベースラインからの変化	無月経[生殖系および乳房障害]のgradingを考慮する
10061261	生殖系および乳房障害	Lactation disorder	乳汁分泌障害	乳汁分泌の軽度の変化, 乳汁生成や授乳への影響はない	乳汁分泌に変化があり, 乳汁生成や授乳に影響がある	-	-	-	乳汁分泌障害。妊娠によって女性に観察されるだけでなく, 男性に観察されることもある	-
10027313	生殖系および乳房障害	Menorrhagia	月経過多	軽症; 鉄分の補給を要する	中等度の症状; 内科的治療を要する(例: ホルモン薬)	入院を要する; 外科的処置を要する(例: 子宮摘出)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	月経期間中の経血量が異常に多い状態	-
10065823	生殖系および乳房障害	Nipple deformity	乳頭変形	症状がない; 乳頭/乳輪のわずかな退縮および/または肥厚による非対称性	症状がある; 乳頭/乳輪の中等度の退縮および/または肥厚による非対称性	-	-	-	乳頭の異常	-
10030300	生殖系および乳房障害	Oligospermia	精子減少症	精子濃度0-1500万 /mL	-	-	-	-	精液中の精子数の減少	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10033169	生殖系および乳房障害	Ovarian function insufficiency	卵巣機能不全	25 IU/Lを超え閉経レベル未満の基礎FSHレベル上昇を伴う連続3月経周期の間欠的/不規則な月経	40 IU/Lを超えるか閉経レベルの基礎FSHレベル上昇を伴う連続3月経周期の無月経	-	-	-	40歳未満で連続3か月以上の稀発月経または無月経があり、血清卵胞刺激ホルモン (FSH) 値が閉経レベルを示す病態。エストロゲン欠乏に伴う症状として、ほてり、寝汗、気分変動、陰乾燥が見られる。検査所見として血清FSH高値が特徴的であり、補助的な所見として血清エストラジオールと抗ミュラー管ホルモン (AMH) の低値が見られる	-
10065763	生殖系および乳房障害	Ovarian hemorrhage	卵巣出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	卵巣からの出血	-
10033279	生殖系および乳房障害	Ovarian rupture	卵巣破裂	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが治療を要さない	輸血を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	卵巣組織の断裂または破裂	-
10033314	生殖系および乳房障害	Ovulation pain	排卵痛	-	あり	-	-	-	排卵時期前後の腹部片側の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10064026	生殖系および乳房障害	Pelvic floor muscle weakness	骨盤底筋力低下	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが、膀胱/腸/陰の機能障害がない; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	骨盤底の筋力の低下	-
10034263	生殖系および乳房障害	Pelvic pain	骨盤痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	骨盤の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10034310	生殖系および乳房障害	Penile pain	陰茎痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	陰茎の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10061339	生殖系および乳房障害	Perineal pain	会陰痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	生殖器と肛門の間の領域の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10055325	生殖系および乳房障害	Prostatic hemorrhage	前立腺出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	前立腺からの出血	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10055026	生殖系および乳房障害	Prostatic obstruction	前立腺閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 待機的処置を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	-	-	前立腺肥大に続発する尿道の圧迫。排尿困難をもたらす(排尿時の緊張, 尿の流れが遅い, 残尿)	-
10036968	生殖系および乳房障害	Prostatic pain	前立腺痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	前立腺の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10038604	生殖系および乳房障害	Reproductive system and breast disorders - Other, specify	生殖系および乳房障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10039757	生殖系および乳房障害	Scrotal pain	陰嚢痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	陰嚢の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10065762	生殖系および乳房障害	Spermatic cord hemorrhage	精索出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	精索からの出血	-
10065805	生殖系および乳房障害	Spermatic cord obstruction	精索閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 待機的処置を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	-	-	精索内の正常な流れの途絶	-
10043306	生殖系および乳房障害	Testicular disorder	精巣障害	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが, 性機能障害がない; 治療を要さない; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 性機能障害がある; 身の回りの日常生活動作の制限; 治療を要する; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	-	精巣の機能または外観の異常	[腎および尿路障害]および[生殖系および乳房障害]の他のAE termのgradingを考慮する
10055347	生殖系および乳房障害	Testicular hemorrhage	精巣出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	精巣からの出血	-
10043345	生殖系および乳房障害	Testicular pain	精巣痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	精巣の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10065811	生殖系および乳房障害	Uterine fistula	子宮瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	子宮と他の器官/解剖学的部位との病的な交通	-
10046789	生殖系および乳房障害	Uterine hemorrhage	子宮出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	子宮からの出血	-
10065928	生殖系および乳房障害	Uterine obstruction	子宮閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 待機的処置を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	-	-	子宮口の閉塞	-
10046809	生殖系および乳房障害	Uterine pain	子宮痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	子宮の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10046901	生殖系および乳房障害	Vaginal discharge	膣分泌物	軽度の膣分泌物の増加(ペー スラインよりも多い)	中等度-高度の膣分泌物の増加; パッド/タンポンの使用を要する	-	-	-	膣分泌物に関する症状。頸管腺で生成される粘液は、特に妊娠可能時期には膣から分泌される	-
10046904	生殖系および乳房障害	Vaginal dryness	膣乾燥	性機能障害のない軽度の膣乾燥	性機能障害/頻繁な不快感を伴う中等度の膣乾燥	性交疼痛/高度の不快感をもたらす高度の膣乾燥	-	-	膣のそう痒および灼熱感を伴う不快感	-
10065813	生殖系および乳房障害	Vaginal fistula	膣瘻	症状がない	症状があるが、侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膣と他の器官/解剖学的部位との病的な交通	-
10046912	生殖系および乳房障害	Vaginal hemorrhage	膣出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膣からの出血	-
10046916	生殖系および乳房障害	Vaginal inflammation	膣の炎症	軽度の不快感/疼痛/浮腫/発赤	中等度の不快感/疼痛/浮腫/発赤; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の不快感/疼痛/浮腫/発赤; 身の回りの日常生活動作の制限; 狭い範囲の粘膜の潰瘍; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 広範囲に及ぶ粘膜潰瘍; 緊急処置を要する	-	膣の炎症。発赤, 浮腫, 著しい不快感, 膣分泌物の増加を含む症状	-
10065817	生殖系および乳房障害	Vaginal obstruction	膣閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 待機的処置を要する	高度の症状; 侵襲的治療を要する	-	-	膣の内腔の閉塞	-
10046937	生殖系および乳房障害	Vaginal pain	膣痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	膣の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10065818	生殖系および乳房障害	Vaginal perforation	膣穿孔	-	侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	膣壁の破裂	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10053496	生殖系および乳房障害	Vaginal stricture	膣狭窄	症状がない; 軽度の膣長短縮/膣の狭窄	膣の狭窄および/または膣長短縮が認められるが内診はできる	膣の狭窄および/または膣長短縮が認められ、タンポンの使用/性行為/内診ができない	-	死亡	膣の内腔の狭窄	-
10001409	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Adult respiratory distress syndrome	成人呼吸窮迫症候群	-	-	画像所見がある; 気管内挿管を要さない	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	肺の基礎疾患を伴わない進行性で生命を脅かす肺の障害。通常大きな外傷や手術の後に生じる	肺臓炎[呼吸器, 胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する
10001723	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Allergic rhinitis	アレルギー性鼻炎	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	-	-	-	外因性のアレルゲンに対するIgEの反応による鼻粘膜の炎症。炎症は、鼻腔粘膜, 眼, 中耳, 喉頭に及ぶ。症状として、くしゃみ, 鼻閉, 鼻汁, そう痒を呈する	-
10002972	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Apnea	無呼吸	-	-	あり; 内科的治療を要する	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	呼吸の停止	-
10003504	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Aspiration	誤嚥	臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	摂食習慣の変化; 食事や嚥下後の咳や窒息のエピソード; 内科的治療を要する (例: 吸引, 酸素)	呼吸困難と肺炎の症状 (例: 誤嚥性肺炎); 入院を要する; 経口摂取が不可能	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	肺への固形物や液体物の吸入	-
10003598	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Atelectasis	無気肺	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある (例: 呼吸困難, 咳); 内科的治療を要する (例: 肺理学療法, 吸引); 気管支鏡による吸引	酸素投与を要する; 入院または待機的外科的処置を要する (例: スtent, レーザー)	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	肺の一部または全肺の虚脱	-
10006437	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Bronchial fistula	気管支瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	気管支と他の臓器/解剖学的部位との病的な交通	-
10006440	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Bronchial obstruction	気管支閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある (例: 軽度の喘鳴); 内視鏡的評価を要する; 画像にて無気肺/肺葉虚脱の所見がある; 内科的治療を要する (例: 副腎皮質ステロイド, 気管支拡張薬)	喘鳴を伴う息切れ, 内視鏡的処置を要する (例: レーザー, stent留置)	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	気管支の閉塞。多くの場合は気管支分泌物と滲出液による	-
10063524	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Bronchial stricture	気管支狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが (例: 雑音/喘鳴) 呼吸障害を伴わない; 内科的治療を要する (例: 副腎皮質ステロイド, 気管支拡張薬)	喘鳴を伴う息切れ, 内視鏡的処置を要する (例: レーザー, stent留置)	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	気管支の狭窄	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10053481	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Bronchopleural fistula	気管支胸膜瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	入院を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	気管支と胸腔との病的な交通	-
10065746	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Bronchopulmonary hemorrhage	気管支肺出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 侵襲的治療を要さない	入院を要する	生命を脅かす; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	気管支壁および/または肺実質からの出血	-
10006482	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Bronchospasm	気管支痙攣	軽度の症状; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	酸素投与を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	気管支壁平滑筋の突然の攣縮または気道の狭窄喘鳴を伴い得る	-
10051228	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Chylothorax	乳び胸	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する(例: 脂肪制限食); 胸腔穿刺または胸腔ドレナージを要する	高度の症状; 待機的外科的処置を要する	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	乳白色の胸水(異常な液体貯留)で, 胸腔のリンパ液貯留による	-
10011224	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Cough	咳嗽	軽度の症状; 市販の医薬品を要する	中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	突然で, しばしば反復する胸腔の痙攣性収縮。肺からの激しい空気の放出と特徴的な音を伴う	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10013963	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Dyspnea	呼吸困難	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	安静時の息切れ; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	息苦しい不快な感覚	心不全[心臓障害]のgradingを考慮する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10015090	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Epistaxis	鼻出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する(例: 鼻タンポン, 焼灼術, 外用血管収縮薬)	輸血を要する; 侵襲的治療を要する(例: 出血部位の止血)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	鼻からの出血	-
10020039	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Hiccups	しゃっくり	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 睡眠に支障がある; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	声門の不随意的な開閉による反復性ののがが鳴る音。横隔膜の痙攣に起因する	-
10020201	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Hoarseness	嗄声	軽度または間欠的な声の変化。ただし完全に聞き取れる; 自然に回復する	中等度または持続的な声の変化, 時に反唱が必要であるが, 電話で聞き取れる; 医学的評価を要する	高度の声の変化(ほとんどがささやき声になる)	-	-	喉頭から生じる/喉頭に広がるしわがれたかすれ声	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10021143	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Hypoxia	低酸素症	症状がない酸素飽和度の<LLNの低下	労作時の酸素飽和度の低下(例:パルスオキシメーターで<88%); 間欠的な酸素投与を要する	安静時の酸素飽和度の低下(例:パルスオキシメーターで<88%またはPaO2<=55 mmHg); 持続的な酸素投与を要する	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例:気管切開や気管内挿管)	死亡	体内酸素レベルの低下	呼吸困難, 肺臓炎[呼吸器, 胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10023838	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngeal edema	喉頭浮腫	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する(例:デキサメサゾン, エピネフリン, 抗ヒスタミン薬)	喘鳴; 呼吸困難; 入院を要する	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例:気管切開や気管内挿管)	死亡	過剰な水分貯留による喉頭の腫脹	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10065786	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngeal fistula	喉頭瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	喉頭と他の臓器/解剖学的部位との病的な交通	-
10065759	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngeal hemorrhage	喉頭出血	軽度の咳またはわずかな喀血; 喉頭鏡所見のみ	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する(例:気管切開や気管内挿管)	死亡	喉頭からの出血	-
10065735	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngeal inflammation	喉頭の炎症	軽度ののどの痛み; かすれ声	中等度ののどの痛み; 鎮痛薬を要する	高度ののどの痛み; 内視鏡的治療を要する	-	-	喉頭に及ぶ炎症	-
10065880	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngeal mucositis	喉頭粘膜炎	内視鏡的所見のみ; 通常の経口摂取が可能な軽度の不快感	中等度の疼痛; 鎮痛薬を要する; 経口摂取の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 摂食/嚥下に高度の変化がある; 内科的治療を要する	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例:気管切開や気管内挿管)	死亡	喉頭粘膜の潰瘍または炎症	-
10059639	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngeal obstruction	喉頭閉塞	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが(例:呼吸時の気道雑音), 呼吸障害を伴わない; 内科的治療を要する(例:副腎皮質ステロイド); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	喘鳴; 内視鏡的処置を要する(例:ステント/レーザー); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	喉頭の気道の閉塞	-
10023862	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngeal stenosis	喉頭狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが(例:呼吸時の気道雑音), 呼吸障害を伴わない; 内科的治療を要する(例:副腎皮質ステロイド); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	喘鳴; 内視鏡的処置を要する(例:ステント/レーザー); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	喉頭の気道の狭窄	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10062667	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngopharyngeal dysesthesia	咽喉頭知覚不全	軽度の症状; 不安はない; 治療を要さない	中等度の症状; 軽度の不安があるが呼吸困難がない; 短期間の観察および/または抗不安薬を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 呼吸困難と嚥下困難; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす	死亡	咽喉頭領域の持続する不快感	-
10023891	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Laryngospasm	喉頭痙攣	-	一過性のエピソード; 治療を要さない	再発性のエピソード; 非侵襲的治療を要する(例: 呼吸法, 指圧)	持続性/重症の失神のエピソード; 緊急処置を要する(例: ファイバー喉頭鏡, 気管内挿管やボトックス注射)	死亡	声帯の発作性痙攣性の筋収縮	-
10056356	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Mediastinal hemorrhage	縦隔出血	軽度の症状; 治療を要さない; 画像所見のみ	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	縦隔からの出血	-
10028735	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Nasal congestion	鼻閉	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	出血を伴う鼻漏または鼻出血	-	-	粘膜浮腫による鼻腔の閉塞	-
10068319	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Oropharyngeal pain	口腔咽頭痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 経口摂取の変化; 非麻薬性薬剤を要する; 外用鎮痛薬を要する	高度の疼痛; 摂食/嚥下に高度の変化がある; 麻薬性薬剤を要する; 非経口栄養を要する	-	-	中咽頭の著しく不快な感覚または嚥下時の疼痛	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10034825	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pharyngeal fistula	咽頭瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	咽頭と他の臓器/解剖学的部位との病的な交通	-
10055315	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pharyngeal hemorrhage	咽頭出血	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 治療を要する	入院を要する	生命を脅かす; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	咽頭からの出血	-
10065881	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pharyngeal mucositis	咽頭粘膜炎	内視鏡的所見のみ; 通常の経口摂取が可能な軽微な症状; 軽度の疼痛があるが鎮痛薬を要さない	中等度の疼痛があり鎮痛薬を要する; 経口摂取の変化; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 十分な栄養や水分の経口摂取ができない; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	咽頭粘膜の潰瘍または炎症	-
10065706	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pharyngeal necrosis	咽頭壊死	-	-	消化管から十分な栄養を摂取できない; 侵襲的治療を要する; 経管栄養またはTPNを要する	生命を脅かす; 緊急の外科的処置を要する	死亡	咽頭に生じた壊死	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10050028	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pharyngeal stenosis	咽頭狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが (例: 呼吸時の気道雑音), 呼吸障害を伴わない; 内科的治療を要する (例: 副腎皮質ステロイド); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	喘鳴; 内視鏡的処置を要する (例: スtent/レーザー); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する (例: 気管切開や気管内挿管)	死亡	咽頭の気道の狭窄	-
10034844	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pharyngolaryngeal pain	咽喉頭疼痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	-	咽喉頭部の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10035598	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pleural effusion	胸水	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 治療を要する (例: 利尿薬/胸腔穿刺を要する)	症状があり呼吸障害と低酸素症を伴う; 外科的処置を要する (胸腔ドレナージ/胸膜癒着術)	生命を脅かす呼吸障害/循環動態の悪化; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	胸腔内滲出液の増加。息切れ, 著しい胸部の不快感を伴う	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10055319	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pleural hemorrhage	胸腔内出血	症状がない; 胸腔穿刺で確認できる軽度の出血	症状がある, または気胸に伴う; 胸腔ドレナージを要する	>1,000 mLの出血; 持続的出血 (150-200 mL/時間が2-4時間続く); 繰り返し輸血が必要; 待機的な外科的処置を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 気管内挿管や緊急処置を要する	死亡	胸腔からの出血	-
10035623	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pleuritic pain	胸膜痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	-	死亡	胸膜の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10035742	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pneumonitis	肺臓炎	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響 (小児)	高度の症状; 酸素投与を要する身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響 (小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する (例: 気管切開や気管内挿管)	死亡	肺実質の局所性またはびまん性の炎症	-
10035759	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pneumothorax	気胸	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状がある; 治療を要する	胸膜癒着術, および/または外科的処置を要する; 入院を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	肺虚脱を生じる胸腔内の異常な空気存在	-
10036402	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Postnasal drip	後鼻漏	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	-	-	-	後鼻腔やのどへの過剰な粘液分泌。咽頭痛や咳を生じる	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10036790	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Productive cough	湿性咳嗽	時々/わずかな痰の出る咳	中等度の痰; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	持続的/多量の痰; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	痰の喀出を伴う咳	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10037375	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pulmonary edema	肺水腫	画像所見のみ; 労作に伴う軽微な呼吸困難	労作に伴う中等度の呼吸困難; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の呼吸困難/安静時呼吸困難; 酸素投与を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置や気管内挿管と人工呼吸を要する	死亡	肺組織への液体の貯留, ガス交換障害を引き起こし肺機能不全を生じ得る	明らかに心臓以外の原因である場合を除いて, この事象は心不全(心臓障害)として記録すること 確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10037383	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pulmonary fibrosis	肺線維症	画像所見上の線維化が総肺容量の<25%で低酸素症を伴う	肺高血圧症; 画像所見上の線維化が25-50%で低酸素症を伴う	高度の低酸素症; 右心不全; 画像所見上の線維化が>50-75%	生命を脅かす(例: 循環動態/肺合併症); 気管内挿管と人工呼吸を要する; 画像所見上の線維化が>75%であり, 高度な蜂巣状変化を伴う	死亡	結合組織による肺組織の置換。進行性の呼吸困難, 呼吸不全, 右心不全の原因となる	-
10065873	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pulmonary fistula	肺瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	肺と他の臓器/解剖学的部位との病的な交通	-
10037400	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Pulmonary hypertension	肺高血圧症	症状がない; 画像/理学的/検査所見	症状がある; 内科的治療を要する	低酸素症や右心不全を伴う高度の症状; 酸素投与を要する	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例: 気管切開や気管内挿管)	死亡	肺障害や心障害による肺動脈系の圧の上昇	-
10038695	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Respiratory failure	呼吸不全	-	-	-	生命を脅かす; 緊急処置/気管内挿管/人工呼吸を要する	死亡	低酸素症と組織の酸素化障害をもたらす, 呼吸器におけるガス交換障害。動脈血の二酸化炭素濃度の増加を伴うことがある	肺臓炎[呼吸器, 胸郭および縦隔障害]のgradingを考慮する
10038738	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Respiratory, thoracic and mediastinal disorders - Other, specify	呼吸器, 胸郭および縦隔障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10039100	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Rhinorrhea	鼻漏	あり	-	-	-	-	鼻の粘液分泌の過剰排出	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10062244	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Sinus disorder	副鼻腔障害	症状のない粘膜の痂皮化, 少量の血液の混じった鼻汁	症状のある狭窄; 浮腫/狭窄によって鼻の通りが悪い; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	顕著な鼻閉を伴う狭窄; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	軟部組織または骨の壊死; 緊急の外科的処置を要する	死亡	副鼻腔の障害	-
10040747	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Sinus pain	副鼻腔痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	副鼻腔由来の, 目と目の間または歯の上部の顔面の著しい不快感	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10040975	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Sleep apnea	睡眠時無呼吸	無呼吸時間のない, いびきと夜間の睡眠からの覚醒	中等度の無呼吸および酸素飽和度の低下; 過度の昼間の眠気, 医学的検査を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	酸素飽和度の低下; 肺高血圧を伴う; 内科的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	心血管系症状/神経精神症状; 緊急の外科的処置を要する	死亡	睡眠時の短時間の呼吸停止	-
10041232	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Sneezing	くしゃみ	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	-	-	-	鼻からの不随意的な空気の排出	-
10041367	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Sore throat	咽喉痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	のどの著しい不快感	-
10042241	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Stridor	上気道性喘鳴	-	-	呼吸障害; 内科的治療を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例: 気管切開や気管内挿管)	死亡	喉頭または上部気道の閉塞による甲高い呼吸音	-
10065787	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Tracheal fistula	気管瘻	症状がない	症状があるが, 侵襲的治療を要さない	侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	気管と他の臓器/解剖学的部位との病的な交通	-
10065900	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Tracheal mucositis	気管粘膜炎	内視鏡的所見のみ; 軽微な喀血/疼痛/呼吸症状	中等度の症状; 内科的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 出血/呼吸症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	気管粘膜の炎症または潰瘍	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10050816	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Tracheal stenosis	気管狭窄	症状がない; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	症状があるが(例: 呼吸時の気道雑音), 呼吸障害を伴わない; 内科的治療を要する(例: 副腎皮質ステロイド); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	喘鳴または呼吸障害; 侵襲的治療を要する(例: スtent/レーザー); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす気道障害; 緊急処置を要する(例: 気管切開や気管内挿管)	死亡	気管の狭窄	-
10047681	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Voice alteration	音声変調	軽度または間欠的な声の変化	中等度または持続的な声の変化; 聞き取れる	高度の声の変化(ほとんどがささやき声になる); 聞き取るために頻回な反唱や顔を近づけて話す必要がある; 補助装置が必要である	-	-	声および/または発語スピードの変化	-
10002953	呼吸器, 胸郭および縦隔障害	Aphonia	失声症	-	-	失声; 話すことができない	-	-	話すことができない。声帯の障害または機能障害(心因性)による	-
10001760	皮膚および皮下組織障害	Alopecia	脱毛症	遠くからではわからないが近くで見るとわかる50%未満の脱毛; 脱毛を隠すために, かつらやヘアピースは必要ないが, 通常と異なる髪形が必要となる	他人にも容易にわかる50%以上の脱毛; 患者が脱毛を完全に隠したいと望めば, かつらやヘアピースが必要; 社会心理学的な影響を伴う	-	-	-	年齢, 部位に相応の量よりも毛髪が減少	-
10005901	皮膚および皮下組織障害	Body odor	体臭	軽度の体臭; 医師による処置を要さない; セルフケア処置	顕著な体臭; 社会心理学的な影響を伴う; 患者が内科的治療を希望する	-	-	-	体表の細菌増殖に起因する異常な体臭	-
10058675	皮膚および皮下組織障害	Dermatitis psoriasiform	乾癬様皮膚炎	あり; 局所的治療を要する	内服治療を要する	静脈内投与による治療を要する	-	-	厚い鱗屑で覆われた大きな紅色の円形局面を特徴とする疾患	-
10012519	皮膚および皮下組織障害	Dermatosis bullous	水疱性皮膚症	症状がない	有痛性の水疱; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	体表面積の>50%を占める水疱; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	体表面積の>75%を占める水疱; 水分や電解質の異常を伴う; ICUや熱傷治療室の管理を要する	死亡	液体で満たされた囊胞の存在を特徴とする皮膚の炎症	感染性の場合, 膿疱性皮膚疹[感染症および寄生虫症]またはその他の[感染症および寄生虫症]のtermのgradingを考慮する
10013786	皮膚および皮下組織障害	Dry skin	皮膚乾燥	紅斑やそう痒を伴わない	紅斑またはそう痒を伴う; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	-	-	-	鱗屑を伴った汚い皮膚; 毛孔は正常だが, 紙のように薄い質感の皮膚	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10014206	皮膚および皮下組織障害	Eczematous dermatitis	湿疹性皮膚炎	あり; 局所的治療を要する	内服治療を要する	静脈内投与による治療を要する	-	-	表皮および真皮浅層に, 乾燥してそう痒を伴う皮疹を呈し, 鱗屑, 痂皮, 漿液性渗出物を伴うことがある	-
10015218	皮膚および皮下組織障害	Erythema multiforme	多形紅斑	皮膚の圧痛を伴わない	皮膚の圧痛を伴う	口腔内や陰部のびらんを伴う	水分バランスの異常または電解質異常を伴う; ICUや熱傷治療室での治療を要する	死亡	中心部は暗赤色で同心円状に辺縁は鮮紅色を呈する矢の的のような斑状病変	-
10015277	皮膚および皮下組織障害	Erythroderma	紅皮症	-	紅斑が体表面積の>90%を占め, 症状を伴わない; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	紅斑が体表面積の>90%を占め, 症状(例: そう痒, 圧痛)を伴う; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	水分バランスの異常または電解質異常を伴う体表面積の>90%を占める紅斑; ICUや熱傷治療室での治療を要する	死亡	全身的な炎症性の紅斑および落屑。炎症は体表面積の>90%を占める	-
10015665	皮膚および皮下組織障害	Exfoliative dermatitis	剥脱性皮膚炎	あり; 局所的治療を要する	内服治療を要する	静脈内投与による治療を要する	生命を脅かす	死亡	体表面積の>90%を占めるびまん性の紅斑と鱗屑	-
10055525	皮膚および皮下組織障害	Hair color changes	毛髪変色	あり	-	-	-	-	毛髪の色の変化または正常色素の喪失	-
10019049	皮膚および皮下組織障害	Hair texture abnormal	毛質異常	あり	-	-	-	-	毛髪の手触りの変化	-
10020112	皮膚および皮下組織障害	Hirsutism	男性型多毛症	女性に起こる男性並みの体毛の長さ, 太さ, 密度の増加で, 定期的なシェービング, 脱色または脱毛で隠すことができる	女性に起こる男性並みの体毛の長さ, 太さ, 密度の増加で, 隠すために毎日のシェービングまたは永久脱毛が必要; 社会心理学的な影響を伴う	-	-	-	女性に起こる, 男性の第二次性徴期類似またはアンドロゲン支配下にあると考えられる, 解剖学的部位の過剰な発毛(あごひげ, 口ひげ, 胸部, 腹部)	-
10020642	皮膚および皮下組織障害	Hyperhidrosis	多汗症	1か所に限局(手掌, 足底, 腋窩), セルフケア処置	>1か所; 患者が内科的治療を希望する; 社会心理学的な影響を伴う	電解質や循環動態の不均衡を伴う	-	-	過剰な発汗	シノニム: 寝汗/Night sweats, 発汗/Diaphoresis
10020649	皮膚および皮下組織障害	Hyperkeratosis	過角化	あり	-	身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	皮膚の外層の肥厚	-
10020864	皮膚および皮下組織障害	Hypertrichosis	多毛症	体毛の長さ, 太さ, 密度の増加で, 定期的なシェービングや脱毛で隠すことができる, または何らかの脱毛処理を行うほどではない	少なくとも通常露出する身体部位(顔のあごひげ, 口ひげ, 腕に限らない)の体毛の長さ, 太さ, 密度の増加で, 隠すために頻回のシェービングや永久脱毛が必要; 社会心理学的な影響を伴う	-	-	-	年齢や人種別に通常受け入れられる限度を超えた, 身体のある部位の体毛の密度または長さ	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10021013	皮膚および皮下組織障害	Hypohidrosis	乏汗症	-	症状がある; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	体温の上昇; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	発汗の減少	-
10024441	皮膚および皮下組織障害	Lichenoid dermatitis	苔癬様皮膚炎	あり; 局所的治療を要する	内服治療を要する	静脈内投与による治療を要する	-	-	体幹および四肢に、上部が平坦な紅色または紫色の丘疹が対称性に出現	-
10028689	皮膚および皮下組織障害	Nail changes	爪の変化	あり	-	-	-	-	爪の変化	-
10028691	皮膚および皮下組織障害	Nail discoloration	爪変色	あり	-	-	-	-	爪の変色	-
10049281	皮膚および皮下組織障害	Nail loss	爪脱落	症状のない爪の剥離または爪の脱落	爪の剥離または爪の脱落による症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	-	-	-	爪のすべてまたは一部の脱落	-
10062283	皮膚および皮下組織障害	Nail ridging	爪線状隆起	あり	-	-	-	-	垂直方向または水平方向の爪の隆起	-
10033474	皮膚および皮下組織障害	Pain of skin	皮膚疼痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛: 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	皮膚の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10054524	皮膚および皮下組織障害	Palmar-plantar erythrodysesthesia syndrome	手掌・足底発赤知覚不全症候群	疼痛を伴わない軽微な皮膚の変化または皮膚炎(例: 紅斑, 浮腫, 角質増殖症)	疼痛を伴う皮膚の変化(例: 角層剥離, 水疱, 出血, 亀裂, 浮腫, 角質増殖症); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	疼痛を伴う高度の皮膚の変化(例: 角層剥離, 水疱, 出血, 亀裂, 浮腫, 角質増殖症); 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	手掌や足底の、発赤、著しい不快感、腫脹、うずき。手足症候群としても知られている	-
10033740	皮膚および皮下組織障害	Papulovesicular rash	丘疹小水疱性皮疹	症状がない	社会心理学的な影響がある; 軽度の症状	体表面積の>50%を占める; 中等度または高度の症状	体表面積の>75%を占める水疱; 生命を脅かす	死亡	小隆起性の丘疹(にきび)と小水疱(液体で満たされた小さな嚢胞)からなる発疹	-
10034966	皮膚および皮下組織障害	Photosensitivity	光線過敏症	疼痛を伴わない紅斑	圧痛を伴う紅斑	落屑を伴う紅斑; 経口副腎皮質ステロイドを要する; 疼痛コントロールを要する(例: 麻薬性薬剤, NSAIDs)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	光線に対する皮膚の感受性の亢進	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10037087	皮膚および皮下組織障害	Pruritus	そう痒症	軽度または限局性; 局所的治療を要する	広範囲かつ間欠性; 掻破による皮膚の変化(例: 浮腫, 丘疹形成, 擦過, 苔癬化, 滲出/痂皮); 内服治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	広範囲かつ常時; 副腎皮質ステロイドの全身投与または免疫抑制療法を要する; 睡眠や身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	強いそう痒感	-
10037549	皮膚および皮下組織障害	Purpura	紫斑	病変部の合計が体表面積の<10%を占める	病変部の合計が体表面積の10-30%を占める	病変部の合計が体表面積の>30%を占める	-	-	皮膚や粘膜領域の出血。新しい病変は赤色で, 古くなると, 通常, 暗紫色を呈し, 最終的に茶褐色に変化する	-
10082061	皮膚および皮下組織障害	Pustular drug eruption	膿疱性薬疹	症状がない	社会心理学的な影響がある; 経口抗生薬または副腎皮質ステロイドを要する; 局所的治療を要する(例: 外用抗生薬/抗真菌薬/抗ウイルス薬); 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 静注の抗生薬または副腎皮質ステロイドを要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす	死亡	紅斑を基盤として, 毛包に一致しない無菌性の膿疱が形成される病態	-
10037868	皮膚および皮下組織障害	Rash maculo-papular	斑状丘疹状皮疹	症状がない	軽度の症状	体表面積の>50%を占める斑状疹/丘疹; 中等度または高度の症状	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	斑状疹(平坦な)および丘疹(隆起した)がある。麻疹状の発疹としても知られている。最もよくみられる皮膚の有害事象で, 体幹上部に求心的に広がり, そう痒を伴う	膿疱性薬疹[皮膚および皮下組織障害]のgradingを考慮する
10049120	皮膚および皮下組織障害	Scalp pain	頭皮痛	軽度の疼痛	中等度の疼痛; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の疼痛; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	頭頂部および後頭部の頭皮の著しく不快な感覚	確定診断/原因特定がされた場合はそれを記録すること
10040785	皮膚および皮下組織障害	Skin and subcutaneous tissue disorders - Other, specify	皮膚および皮下組織障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10040799	皮膚および皮下組織障害	Skin atrophy	皮膚萎縮	毛細血管拡張または皮膚色の変化を伴う	線条を形成する, または皮膚付属器腺の消失を伴う	潰瘍を伴う	-	-	表皮と真皮の変性および菲薄化	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語【定義】	ナビゲーションノート
10040865	皮膚および皮下組織障害	Skin hyperpigmentation	皮膚色素過剰	あり	社会心理学的な影響を伴う	-	-	-	メラニンの過剰による皮膚色素沈着	-
10040868	皮膚および皮下組織障害	Skin hypopigmentation	皮膚色素減少	あり	社会心理学的な影響を伴う	-	-	-	メラニン色素の減少(例:尋常性白斑)	-
10051837	皮膚および皮下組織障害	Skin induration	皮膚硬結	軽度の硬結で、皮膚を水平に動かす(横滑り)ことができ、垂直に動かす(つまみ上げる)ことができる	中等度の硬結で、皮膚を横滑りできるがつまめない;身の回り以外の日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	高度の硬結で、皮膚の横滑りもつまみ上げもできない;関節や開口部(例:口、肛門)の運動制限;身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	全身性;呼吸困難や嚥下障害の徴候や症状を伴う	死亡	皮膚の一部の硬化	-
10040947	皮膚および皮下組織障害	Skin ulceration	皮膚潰瘍形成	潰瘍部の合計の径が<1 cm;正常皮膚の押しでも消退しない紅斑で、浮腫や熱感を伴う	潰瘍部の合計の径が1-2 cm;真皮までの皮膚欠損。皮膚または皮下脂肪に及ぶ損傷	潰瘍部の合計の径が>2 cm;皮膚の全層欠損または皮下組織から筋層に及ぶ損傷または壊死	大きさを問わず皮膚の全層欠損の有無も問わない;筋、骨、支持組織に及ぶ広範囲の破壊/組織壊死/損傷を伴う潰瘍	死亡	皮膚の限局性のびらん性病変	-
10042033	皮膚および皮下組織障害	Stevens-Johnson syndrome	スティーヴンス・ジョンソン症候群	-	-	体表面積の<10%を占める表皮壊死	体表面積の>=10%を占める表皮壊死;生命を脅かす	死亡	通常は体表面積の10%未満の体皮の真皮からの剥離。この症候群は皮膚と粘膜における複合的な過敏症と考えられている	-
10042344	皮膚および皮下組織障害	Subcutaneous emphysema	皮下気腫	症状がない、または軽度の症状;臨床所見または検査所見のみ;治療を要さない	中等症;最小限/局所的/非侵襲的治療を要する	重症または医学的に重大であるが、ただちに生命を脅かすものではない;入院または入院期間の延長を要する;身の回りの日常生活動作の制限;年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	-	-	皮下組織に空気がある状態	-
10043189	皮膚および皮下組織障害	Telangiectasia	毛細血管拡張症	あり	社会心理学的な影響を伴う	-	-	-	毛細血管の局所的な拡張で、皮膚や粘膜の発赤を呈する	-
10044223	皮膚および皮下組織障害	Toxic epidermal necrolysis	中毒性表皮壊死融解症	-	-	-	表皮壊死が体表面積の>=30%を占め、症状を伴う(例:紅斑、紫斑、表皮の剥離);生命を脅かす	死亡	体表面積の30%を超える体皮の真皮からの剥離。この症候群は皮膚と粘膜における複合的な過敏症と考えられている	-
10046735	皮膚および皮下組織障害	Urticaria	蕁麻疹	局所的治療を要する	内服治療を要する	静脈内投与による治療を要する	-	-	かゆみを伴う皮疹で、内部が青白く、辺縁部が鮮明な赤色を呈する膨疹	アレルギー反応、アナフィラキシー[免疫系障害]のgradingを考慮する

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)
 [CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10041244	社会環境	Social circumstances - Other, specify	社会環境, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10042613	外科および内科処置	Surgical and medical procedures - Other, specify	外科および内科処置, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10073529	血管障害	Arterial thromboembolism	動脈血栓塞栓症	-	-	緊急処置を要する	生命を脅かす; 循環動態が不安定または神経学的に不安定; 臓器障害; 四肢の喪失	死亡	動脈内血栓による動脈血管の閉塞	中枢神経系関連イベントでは脳卒中, 一過性脳虚血発作[神経系障害]のgradingを考慮する また, 該当する場合は心筋梗塞[心臓障害]のgradingを考慮する
10007196	血管障害	Capillary leak syndrome	毛細血管漏出症候群	症状がない	症状がある; 内科的治療を要する	高度の症状	生命を脅かす	死亡	血管内液の血管外への漏出 この症候群は全身の毛細血管が漏れやすくなっている患者に観察され, ショック症候群, 拍出量低下状態, 虚血再灌流障害, 毒血症, 薬物投与, 毒物投与に引き続いて生じる浮腫や多臓器不全を生じ得る	-
10016825	血管障害	Flushing	潮紅	軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への軽度/中等度の影響(小児)	低血圧および/または頻拍を伴う症状がある; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への高度の影響(小児)	-	-	一時的に起こる皮膚, 特に顔面, 頸部, 胸部の紅潮	-
10019428	血管障害	Hematoma	血腫	軽度の症状; 治療を要さない	最小限の侵襲での漏出または吸引を要する	輸血を要する; 侵襲的治療を要する	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	血管壁の破綻により起こる限局性の血液の集まりで, 通常は臓器, 組織間隙, 組織内に凝血する	硬膜下血腫と硬膜外血腫は頭蓋内出血[神経系障害]として報告する
10020407	血管障害	Hot flashes	ほてり	軽度の症状; 治療を要さない	中等度の症状; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活動作への高度の影響(小児)	-	-	強い体熱感やほてりといった一過性の不快な感覚。時には涼しくても発汗を伴う	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10020772	血管障害	Hypertension	高血圧	-	成人:収縮期血圧140-159 mmHg または拡張期血圧90-99 mmHg; 再発性または持続性 小児および青年:再発性または 持続性(>=24時間)の>ULNの血 圧上昇;単剤の薬物治療を要す る;収縮期/拡張期血圧が>95 パーセンタイルと99パーセンタイ ルの5 mmHg上の間; 青年:<95パーセンタイルであっ ても、収縮期血圧130-139 mmHg または拡張期血圧80-89 mmHg	成人:収縮期血圧160 - 179 mmHgまたは拡張期血圧100 - 109 mmHgが1時間を超えて持 続; 収縮期血圧>140かつベース ラインから収縮期血圧>20 mmHgまたは平均動脈圧 (MAP)>15 mmHgの上昇; 小児および青年:収縮期/拡 張期血圧が99パーセンタイル より>5 mmHg上回る	成人および小児:収縮 期血圧>=180 mmHgま たは拡張期血圧>=110 mmHgが1時間を超えて 持続;臓器障害を来す 急性高血圧; 生命を脅かす(例:悪性 高血圧、一過性または 恒久的な神経障害、高 血圧クリーゼ);緊急処 置を要する	死亡	病的な血圧の上昇	-
10021097	血管障害	Hypotension	低血圧	症状がなく、治療を要さない	非緊急の内科的治療を要する	内科的治療を要する;入院を 要する	生命を脅かし、緊急処置 を要する	死亡	置かれた環境により期待され る正常レベルの血圧を下回る 血圧	-
10065773	血管障害	Lymph leakage	リンパ漏		症状がある;内科的治療を要 する	高度の症状;侵襲的治療を要 する	生命を脅かす;緊急処 置を要する	死亡	周辺組織または体腔へのリン パ液の漏出	-
10025233	血管障害	Lymphedema	リンパ浮腫	わずかな肥厚またはわずかな 褪色	顕著な褪色;革のような皮膚 の質感;乳頭様隆起の形成; 身の回り以外の日常生活動 作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の軽度/中等度の影響(小児)	高度の症状;身の回りの日常 生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活へ の高度の影響(小児)	-	-	腫脹の原因となる過剰な水分 貯留	確定診断/原因特定がされた 場合はそれを記録すること
10048642	血管障害	Lymphocele	リンパ嚢腫	症状がない;臨床所見または 検査所見のみ;治療を要さ ない	症状がある;内科的治療を要 する	高度の症状;侵襲的治療を要 する	-	-	リンパ液を含む嚢胞性病変	-
10034578	血管障害	Peripheral ischemia	末梢性虚血	-	内科的に管理でき、永続的障 害を残さない短時間(<24時 間)の虚血症状;間欠性跛行	持続的(>=24時間)または再 発性の症状および/または侵 襲的治療を要する;安静時の 疼痛	生命を脅かす;重大な 組織損失;緊急の外科 的処置を要する	死亡	四肢の循環障害	-
10034879	血管障害	Phlebitis	静脈炎	-	あり	-	-	-	静脈留置針により生じる末梢 静脈の壁の炎症	-
10042554	血管障害	Superficial thrombophlebitis	表在性血栓性静脈炎	-	あり	-	-	-	四肢の表在性静脈の血栓と 炎症	-
10042569	血管障害	Superior vena cava syndrome	上大静脈症候群	症状がない;SVC血栓症の偶 発的発見	症状がある;内科的治療を要 する(例:抗凝固療法/放射線 療法/化学療法)	高度の症状;集学的治療を要 する(例:抗凝固療法/化学療 法/放射線療法/ステント)	生命を脅かす;緊急の 集学的治療を要する (例:血栓溶解,血栓除 去術,手術)	死亡	上大静脈の血流障害。顔面、 首、上腕の腫脹とチアノーゼ、 咳、起坐呼吸、頭痛などの徴候 や症状	-

有害事象共通用語規準v6.0日本語訳JCOG版 (CTCAE v6.0 – JCOG)

[CTCAE v6.0/MedDRA v28.1 (日本語表記: MedDRA/J v28.1) 対応 -2026年3月1日]

CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 LLT Code	CTCAE v6.0 SOC 日本語	CTCAE v6.0 MedDRA 28.0 Term	CTCAE v6.0 Term 日本語	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	CTCAE v6.0 AE Term Definition 日本語 【定義】	ナビゲーションノート
10047065	血管障害	Vascular disorders - Other, specify	血管障害, その他(具体的に記載)	症状がない, または軽度の症状; 臨床所見または検査所見のみ; 治療を要さない	中等症; 最小限/局所的/非侵襲的治療を要する; 身の回り以外の日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への軽度/中等度の影響(小児)	重症または医学的に重大であるが, ただちに生命を脅かすものではない; 入院または入院期間の延長を要する; 身の回りの日常生活動作の制限; 年齢相応の正常日常生活への高度の影響(小児)	生命を脅かす; 緊急処置を要する	死亡	-	-
10047115	血管障害	Vasculitis	血管炎	症状がなく, 治療を要さない	中等度の症状; 内科的治療を要する	高度の症状; 内科的治療を要する(例: 副腎皮質ステロイド)	生命を脅かす; 末梢または内臓の虚血; 緊急処置を要する	死亡	血管壁の炎症	-
10066899	血管障害	Venous thromboembolism	静脈血栓塞栓症	内科的治療を要さない(例: 表在性血栓)	内科的治療を要する	緊急の内科的治療を要する	循環動態や神経症状が不安定で生命を脅かす状態	死亡	血流に乗って遠位側から移動してきた血栓によって血管が閉塞する病態(例: 深部静脈血栓症(DVT), 肺塞栓症(PE)など)	中枢神経系関連イベントでは脳卒中, 一過性脳虚血発作[神経系障害]のgradingを考慮する 動脈血栓には動脈血栓塞栓症[血管障害]を用いる カテーテルによる場合は血管確保合併症[傷害, 中毒および処置合併症]を用いる
10011703	血管障害	Cyanosis	チアノーゼ		あり	-	-	-	皮膚および/または粘膜が蒼白になること	-